

64. 长嘴地鸫 *Zoothera marginata* Blyth

别名 长嘴山鸫。

英文名 Long-billed Thrush, Lesser long-billed Thrush.

地理分布 国内仅见于云南景东、勐仑、绿春(留鸟)。国外分布于尼泊尔, 印度, 不丹, 缅甸, 泰国, 老挝和越南北部。

鉴别特征 嘴粗壮而长; 尾短。上体橄榄赤褐色; 喉污白色, 两侧具暗褐色条纹; 腹浅黄白色, 具橄榄褐扇形斑; 两胁橄榄褐, 亦具浅白色条纹。飞行时, 翼下的皮黄色块斑特别明显。

形态 (依据采自云南勐仑标本) 两性相似。上体自头至尾上覆羽以及尾羽等悉橄榄赤褐色; 初级飞羽、次级飞羽、大覆羽等羽绿色淡, 微染砖红色; 头侧、耳羽杂以茶黄和暗褐色。颈、喉白色, 喉侧具不规则暗褐色横斑; 两胁暗橄榄色, 具浅白色条纹; 胸、腹淡黄白, 具橄榄褐扇形斑; 腋羽淡皮黄色, 具宽的黑色中央横斑; 翼下具皮黄色块斑。

虹膜暗褐色; 嘴暗褐至黑色; 脚浅角褐色。

量衡度:

| 性别 | 体重 | 全长 | 嘴峰 | 翅 | 尾 | 跗蹠 |
|------|----|-----|------|-----|----|------|
| ♂(1) | 68 | 240 | 29.2 | 119 | 68 | 31.3 |

生态 长嘴地鸫在国内仅见于云南景东、勐仑、绿春, 至今只采到 3 号标本(收藏于中国科学院昆明动物研究所)。是极为罕见的稀有种类。迄今对长嘴地鸫的生态知之甚少, 仅见于单个或成对活动于地面上, 以昆虫为食。

Zoothera marginata Blyth, 1847, Journ. As. Soc. Bengal 16:141 (模式产地: 缅甸 Arrakan); Baker, 1925—30, 2:168—169; 郑作新, 1958, 168—169; Ripley (in Mayr et Paynter), 1964, 10: 160; Ali et Ripley, 1973, 9: 104—105; 彭燕章等, 1980, 275; 郑作新, 1987, 630.