

46. 黑白林鶲 *Saxicola jerdoni* (Blyth)

英文名 Jerdon's Bushchat.

地理分布 见于云南西部及南部西双版纳等地为留鸟。国外见于印度,孟加拉国,缅甸,老挝及越南。

鉴别特征 雌雄羽色不同。雄鸟上体从头至尾以及两翅均为黑色;下体从颈到尾下覆羽纯白。雌鸟上体以褐色为主,无黑色。

形态 上体从头、背至腰概呈辉蓝褐黑色,腰部羽毛末端有少许白色,两翅及尾羽褐黑色,其外缘辉亮,下体全白。据 Baker (1924), 雌鸟体型较雄鸟略小,上体全部褐色,下背和腰等稍着棕色,尾上覆羽棕色;两翅褐色,羽缘棕色,颈和喉白色;下体余部淡棕黄色,胸及两胁较暗。

虹膜暗褐色,嘴、跗蹠、爪等均为黑色。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂ ♂(5)	13—14	143—155	11—12	66—69	68—72	23—24
♀ ♀(2)	7,15	165,157	11,12	67	72,69	23

本种至今未见有亚种分化。

生态 此鸟单独或结集2—3只小群,栖于坝区的芦苇丛中、田间灌丛矮树梢上,或站于电线上,见有饵物时,就猛扑捕捉。据昆明动物研究所(1980),此鸟以昆虫为食。

Oreicola jerdoni Blyth, 1867, Ibis (2) 3:14; nom. nov. for.

Rhodophila melanoleuca Jerdon, 1863, Bds. Ind. 2:128 (模式产地: 印度 Purneah); nec of Bonaparte, 1854.

Saxicola jerdoni Baker, 1924, 35—36; Gee, 1926, 218; 郑作新, 1958, 148; Ripley (*in Mayr et Paynter*), 1964, 114; 昆明动物研究所, 1980, 158; de Schauensee, 1984, 355; Ali et Ripley, 1987, 587—588; 郑作新, 1987, 612.