


## 15. 山鹟 *Anthus sylvanus* (Hodgson)

**地理分布** 分布于四川中部峨边及宜宾、西部康定、西南部西昌,云南西部和东南部,广西瑶山,江西,浙江杭州[寿振黄],福建福州,广东沿海(留鸟)。国外见于东阿富汗,尼泊尔等地。据说无迁徙现象,但在印度艾他瓦有过记录 (Vaurie 1959)。

**鉴别特征** 额、头顶、上体棕色或棕褐色,各羽具比较粗著的黑褐色纵纹,尾羽的端部狭而呈尖形,下体除颈、喉和下腹中央部分以外悉具黑褐色狭细纵纹。

**形态** (据昆明黑龙潭的标本)

上体棕色或棕褐色,各羽具较宽的黑褐色纵纹;尾羽黑褐色,具淡棕白色狭缘,中央一对尾羽尤为尖细,呈箭状,其余尾羽端部尖细,呈尖形,最外侧一对尾羽除基部黑褐色外,其余部分呈棕色或褐白色,第二对外侧尾羽端部具棕色或褐白色的楔状白斑,第三对外侧尾羽的端部具棕色或褐白色小斑;两翼黑褐色,具褐白色狭缘,内侧次级飞羽及大覆羽的外翮具较宽的棕褐色羽缘;眉纹棕白色,头侧棕白色、具暗褐色点斑;下体棕白色或褐白色沾灰,除喉和下腹中央外,均具黑褐色狭细的羽干纹。



分布图 47 山鹟 *Anthus sylvanus* ●

虹膜褐色;嘴暗褐色,下嘴基部较淡,呈肉褐色;脚淡肉色,爪淡肉色。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(6)	30.9 (26—33)	165.5 (136—180)	13.2 (12—14.5)	77.5 (76—79)	71.6 (68—73)	22.8 (21—24)
♀(1)	19	150	9	81	69	19

**生态** 栖息于山林、草地、农田,喜在峻峭的山坡、岩石间或灌木丛中,单个或成对活动。叫声似“Seetyu--Seetyu……”。繁殖在海拔 1,200—3,000 米之间的地区,最低到 900 米,最适宜地区为 1,200—2,400 米,冬天向下迁移,但不低于海拔 900 米(Ali et Ripley, 1973)。

1974—76 年 6 月—7 月在云南采得的 2 只鸟胃,内有鳞翅目幼虫(2 次)、鞘翅目甲虫(2 次)和其它昆虫(1 次)。

繁殖期多在 4—7 月。巢呈环状,由牧草或其它草的茎叶构成,巢筑于草丛或石头旁较凹陷的地方。每巢 3—5 枚卵,卵呈灰白色。

*Heterura sylvana* Hodgson, in Blyth, 1845, Journ. As. Soc. Bengal 14:556 (模式产地: 尼泊尔)。

*Corydalla kiangsinensis* David et Oustalet, 1877, Ois. Chine:311, 图版 37 (模式产地: 江西)。

*Anthus sylvanus*, 郑作新, 1976, 427; 昆明动物所, 1980, 110; Ali et ripley, 1973, 9:271—272; Howard, 1980, 357; Peters, 1960, 9:162; Vaurie, 1959, 73—74.