

6. 三趾翠鸟 *Ceryx erithacus* (Linnaeus), 1758

别名：小黄鱼狗。

英文名：Three-toed Kingfisher.

地理分布 云南西部腾冲、南部西双版纳、东南部河口，海南（留鸟）。国外广泛分布于东南亚及印度。

鉴别特征 和普通翠鸟相似，嘴红，翼黑褐，下体金黄，脚仅3趾。形态（依据指名亚种，标本采自海南岛）。

成鸟 额黑色；头、颈橙红色；肩羽灰褐色，羽毛端部具深蓝色羽缘；上背深蓝；下背、腰、尾上覆羽、尾羽橙红色，除尾羽外，其他各部位中央紫红色，具反光。翼灰褐色。颊白色；喉淡蛋黄白色；耳羽紫红色，具反光；嘴下至胸、腹、尾下覆羽蛋黄色，嘴以下至胸、尾下覆羽较深，腹部较浅。

虹膜棕色；嘴、脚红色。

量衡度 (mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(3)	12—18	122—132	31—33	54—57	22—26	8—10
♀♀(4)	14.5—18	137	31—33	54—58	20—27	8—10

亚种分化 本种有5亚种，我国仅1亚种。

(1) 指名亚种 *Ceryx erithacus erithacus* (Linnaeus)

此亚种在国内的分布与种相同。国外见于印度，孟加拉，缅甸，泰国，中南半岛三国，印度尼西亚的苏门答腊。

形态和量衡度见种的描述。

Alcedo erithacus Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1: 115 (孟加拉).

Ceryx erithacus erithacus Pseters, 1955, 5: 184; 郑作新, 1976, 337.

生态 栖于多树的山涧小溪旁，常停立溪旁的树丫或岩石上，静候水中食饵。胃中有小鱼、小虾及甲壳昆虫。

经济意义 国内种群数量非常有限，属珍稀鸟类，应该加以保护。由于它的羽色鲜艳，人们非常喜爱而捕捉，故应更加保护。

Alcedo erithaca Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1: 115 (孟加拉).