


11. 草地鹨 *Anthus pratensis* (Linnaeus)

地理分布 分布于新疆西部(冬候鸟);天山(罕见旅鸟)。国外分布于古北区西部,苏联伯朝拉河地区,乌拉尔北部,鄂毕河一带,西伯利亚西北部等,格陵兰东北部,冰岛,法罗群岛,不列颠群岛,法国南部,意大利北部,南斯拉夫等;冬天见于北非,克里米亚,高加索,



分布图 43 草地鹨 *Anthus pratensis pratensis*

小亚细亚和近东,伊拉克和伊朗,外里海等地。

鉴别特征 成鸟胸部密杂以黑色纵纹,翼上内侧覆羽端缘纯白,背羽无白缘,腰纯白无斑。

形态 (据 *A. p. pratensis*)

上体淡橄榄褐绿色,具黑褐色纵纹,头部的纵纹较细,背部的纵纹较粗,向后纵纹逐渐消失;中央尾羽黑褐色,具淡色羽缘,外侧第1对尾羽内翈及其基部为暗褐色,其余部分为白色,外侧第2对尾羽羽端具不大的白斑,其余尾羽深褐色,具淡色羽缘;飞羽暗褐色,具淡色羽缘,大覆羽和三级飞羽具宽大的褐白色羽缘,形成翼斑,下体白色沾褐;颊、喉部、胸及肋部带有明显的黑褐色纵纹。

虹膜黑褐色;嘴黑褐色;脚淡褐色。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♀(1)	17	151	11	73	59	21

亚种分化 草地鹨分为2个亚种,分布于中国的只有1个亚种。

(1) 指名亚种 *Anthus pratensis pratensis* Linnaeus

分布于新疆西部(冬候鸟);天山(罕见旅鸟)。国外分布除冰岛极西部外,同种的分布。

Alauda pratensis Linnaeus, 1958, Syst., ed. 10, 1:166 (模式产地: 瑞典)。

生态 栖息于山地近水的草地、沼泽、灌木丛及林缘。多单个或成对活动。

繁殖期约在4—7月间,营巢在4—5月之间,5月13—18日就可看到孵卵的鸟。筑巢在地上,巢由干的草茎铺成,在苔原地带巢筑于较隐蔽的土丘、石堆有草处。

Anthus pratensis Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1:166 (模式产地: 瑞典)。

Anthus pratensis, 郑作新, 1976, 424; Ali et Ripley, 1973, 9: 250; Howard, 1980, 357; Peters, 1960, 9: 159, Vaurie, 1959, 69.