

10. 大天鹅 *Cygnus cygnus* (Linnaeus) (图版一：下图)


别名：鹄(古通名)、咳声天鹅、白鹅(河北、内蒙古等地和东南通名)。

地理分布 繁殖于我国北部、越冬于华中及东南沿海。在国外，繁殖在欧亚大陆北部及北美洲的西北部；越冬于亚洲中部、欧洲、非洲西北隅及北美洲西北的部分地区。

鉴别特征 遍体雪白；嘴基两侧黄斑沿嘴缘向前伸于鼻孔之下；颈修长，在水面上经常直伸。身体的整个比例都比小天鹅大。

形态 (据指名亚种)

成鸟(繁殖羽)：雌雄同色，雌略小于雄；全身洁白，仅头稍沾棕黄色。



分布图 5 天鹅 *Cygnus*

1. 大天鹅 *C. c. cygnus* 2. 小天鹅 *C. columbianus jankowskii* 3. 疣鼻天鹅 *C. olor*

虹膜暗褐色；嘴黑，上嘴基部两侧的黄斑前伸至鼻孔之下；跗蹠、蹼、爪均黑色。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(2)	7,000—7,150	1,215—1,482	107—108	580—595	150—160	106—107
♀♀(2)	—	—	104—114	610—632	163—178	105—107

亚种分化 共有两个亚种。我国境内只有一亚种，即：

指名亚种 *Cygnus cygnus cygnus* (Linnaeus)

繁殖在黑龙江省呼伦贝尔盟，内蒙古鄂尔多斯，新疆天山北部；迁徙经华北而至长江中、下游及东南沿海等省越冬。在国外，繁殖于欧亚大陆北部，冬季迁至亚洲中部和南部、欧洲及非洲西北隅。

形态见前文。

Anas cygnus Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1: 122 (瑞典)

生态 大天鹅常栖居于多蒲苇的大型湖泊中，食料较丰富的池塘、水库里也常见到它们的踪迹。一般成对活动，雏鸟孵出后一直跟随亲鸟，直到迁往越冬地。南迁时，经常组成6—20余只小群，队列呈“一”字形或“人”字形。鸣声响亮，音似“ho-ho”或“houk”。

在南方，它们常和小天鹅混群，但无论是在取食或休息时都保持着成对的现象。越冬地区，大天鹅虽不是优势种，但在洞庭湖、鄱阳湖一带，以及长江中的沙洲上到处可见。关贯勋等于1960年11月31日下午2—3时在洞庭湖北岸进行数量统计时，共见到23群计431只天鹅飞过，其中包括小天鹅。

食物主要有水生植物的种子、茎、叶和杂草种子，也兼食少量的软体动物、水生昆虫和蚯蚓等。大天鹅的嘴强大，掘食能力强，能挖食埋藏在淤泥下0.5米左右的食物。据湖南省华容县隆西公社全福大队的狩猎队反映，在天鹅的胃中发现有大量的野菱角、莲藕和砂砾等。寿振黄1934年剖检一只大天鹅胃中有150个胡颓子(*Elaegnus*)和砂砾。

大天鹅是我国珍禽之一，已列为我国保护对象。

Anas cygnus Linnaeus, 1758, Syst. Nat. ed. 10, 1: 122 (模式产地：瑞典)。