

## 6. 小白额雁 *Anser erythropus* (Linnaeus)

别名: 弱雁(辞典)。

**地理分布** 迁徙期间见于东北中部哈尔滨、南部营口,河北东北部,山东,河南;越冬于长江中、下游以至福建及广东,偶见于台湾。在国外,繁殖在西伯利亚和欧洲的极北部;冬季可到欧洲东南部,埃及北隅,亚洲西南部、北部,朝鲜和日本。

**鉴别特征** 与白额雁很相似,但体形较小些,嘴短且细;体色深些;额上白斑较大,伸至两眼间。

**形态** 体形较白额雁较小些。雌雄两性相似。嘴基和额上白色带斑特显著,伸展到两眼间,白斑后缘黑;头顶、后颈暗褐色;上体暗褐,各羽端缘黄白色;外侧几枚初级飞羽的外羽片灰褐,余均黑褐色;次级飞羽黑褐;内侧覆羽和飞羽与背同色;小翼羽及外侧覆羽灰褐色;尾上覆羽白色;尾羽暗褐,羽尖纯白;颌和喉灰褐,前端具一小白斑;前颈、上胸暗褐;




图 17 小白额雁(×1/10)

下胸灰褐,羽端棕白;腹白而杂以黑色不规则块斑;两胁灰褐,羽端黄白色;肛周及尾下覆羽纯白。

虹膜褐色;嘴肉色或玫瑰肉色,嘴甲淡白;脚和腿橄榄黄,蹼淡色,爪淡白。在新鲜标本、眼周有一肿起的黄圈,以别于白额雁。

雄性幼鸟(依据 1957 年 9 月 28 日采自黑龙江省永翠的标本): 体重 1,750 克,全长 443.2,嘴峰 30.4,翅 324.2,尾 100,跗蹠 56 毫米。体色较成鸟淡;嘴肉色,嘴甲黑;额上无白斑;腹部亦无黑斑。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(2)	1,750	443	36.5—41	270—330	91—117	59.6—61.3
♀♀(3)	1,003—1,750	565—596	36.3—40.4	367—376	100—117	60—62.4

**生态** 与白额雁的习性相似,也是秋来春返的候鸟。性喜结群,但不与白额雁混杂。空中飞行时发出的叫声比白额雁较尖锐且快。

食性和白额雁一样,以各种湖草为食,也吃谷类、种子和各种小秋作物幼叶、嫩芽等。是一种狩猎禽,但甚罕见,经济意义不大。