


### 13. [栗]树鸭 *Dendrocygna javanica* (Hersfield)

别名: 尼鸭(广西), 啸鸭。

**地理分布** 长江中下游, 台湾(夏候鸟); 云南西部、南部, 广西西南部(留鸟); 广东及沿海岛屿、海南岛(3—5月); 福建(10—11月)。国外见于斯里兰卡, 印度, 孟加拉国, 缅甸, 泰国, 中南半岛, 琉球群岛, 印度尼西亚的苏门答腊、爪哇、加里曼丹西南部及邻近岛屿。



分布图6 [栗]树鸭 *Dendrocygna javanica*

甸, 泰国, 中南半岛, 琉球群岛, 印度尼西亚的苏门答腊、爪哇、加里曼丹西南部及邻近岛屿。

**鉴别特征** 体形略小于家鸭。雌雄相似。上体主要为黑褐色, 尾上覆羽及胸、腹等均栗色。

**形态** 雌雄相近似。头顶、枕部等均棕褐色, 而杂以黑褐色细纹; 额浅棕, 有一条黑褐色带纹由枕部延伸到后颈; 背和肩黑褐色, 羽毛边缘灰棕以至全棕色, 而背的最上部仅灰棕色的羽缘显露在外, 使此部几成纯灰棕色; 腰黑色, 有时具有狭窄的灰棕色羽缘; 小、中覆羽栗红色, 大覆羽及飞羽黑褐色; 两颊灰黄色; 颏、喉近白色; 上胸黄棕色, 下胸、腹及两肋均呈浅栗色, 但后者杂以黄棕色, 尾下覆羽棕白至乳白色。

虹膜棕褐色; 活时眼圈为橘黄色; 跗蹠深石板色, 嘴在鼻孔前为深石板色, 鼻孔后为石板青色。制成标本后, 眼圈为橙红色, 嘴和跗蹠皆为黑色。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(8)	400—501	371—417	37.5—44	186—204	56—69	41—55
♀♀(8)	400—600	368—408	38—43.5	181—197	49—67	42—50

**生态** 根据在广西穿山地区的观察, 4月下旬陆续迁来, 10月下旬逐渐迁离。平时栖息在池塘、湖沼以及水库等水域里, 喜隐匿在高草丛中或荷叶下, 也见成群栖息在水面上。性机警。一群中常有几只不时引颈四望, 遇人或敌害临近时就首先起飞, 其他树鸭随着相继飞起。飞行力弱, 速度不甚快, 常边飞边发出轻而尖的啸声。夏季中午炎热时成群隐蔽在水草中。潜水能力很强。当被击伤不能飞时, 就潜入水中, 一次潜水可十几分钟。太阳快下落时就成对或七、八只, 或二十只左右结群飞向附近农田觅食, 黎明前返回白天栖息的水域。不受惊扰, 一般不迁换栖息地。

1976年5—6月在广西穿山地区, 剖检的4只树鸭的嗉囊中皆为稻谷, 最长达32克, 只在一个嗉囊中见有甲虫。

1976年5月下旬猎获的雌鸭输卵管中尚有一待产的具白色卵壳的卵。在广西穿山地区, 巢筑在距水1—2华里外的山腰草丛间, 四周无树或树甚少, 未见此鸭营巢或栖息于树上。所以有人就依据它的鸣声叫做啸鸭。巢用茅草构成, 间或铺些羽毛或蕨叶。巢径25厘米左右, 高6厘米。每窝卵8—14枚, 一般10枚左右, 皆为白色。卵重32—35克, 大小45—48×38—39毫米。雌雄共同孵卵。当地群众反映, 6月下旬已能见到雏鸭, 形状与家鸭相似, 具黑白斑。白天与亲鸟一起在池塘内高草丛中或荷叶下, 晚间随亲鸟一起到田间觅食。

**经济意义** 树鸭在广西穿山地区主要以稻谷为食, 迁来时适逢育秧期, 以水稻秧田播下的谷种为主要食物。稻谷成熟时常集成大群, 对稻谷产量造成一定损失。