

2. 红胸黑雁 *Branta ruficollis* (Pallas)

地理分布 偶见于我国湖南省洞庭湖及广西南宁等处,为冬时迷鸟。繁殖于苏联北部的冻原地带。冬时迁徙到里海南部和咸海一带。

鉴别特征 小型雁类,体羽鲜艳。胸和颈侧有大块栗红色,外围以白边;下腹和尾的下部白色;体羽的其他部分为黑褐色。

形态 此雁雌雄羽色相同。头黑褐,在眼和嘴之间各具一椭圆形块状白斑;后颈黑褐;颈侧自眼后起有大块栗红色,外围以宽阔的白色纹;背黑褐;两翅与背同。中覆羽和大覆羽的先端带棕色,因而在翅上形成二道横斑;初级覆羽的先端也沾有棕色。胸棕红;腹黑褐;两胁白,前胁各羽微具黑端,后胁的黑端较粗著,形成体侧的数条黑斑;下腹和尾下覆羽白色;尾羽亦黑,具白端,尾上覆羽白色。



图 14 红胸黑雁(×1/8)

跗蹠、脚、爪和嘴均黑褐。

幼鸟: 在湖南洞庭湖采得。颈侧大都白色,前宽后窄,在前面白色羽的扩大部中央杂以栗红色;胸亦栗红,但较浅,几近棕色,外围以白色带纹。

量度:

性别	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♀(1)	25	354	109	64
幼(1)	26	337	108	53

生态 典型的北极海洋鸟类,能耐严寒,喜栖于海湾、海港及河口等。冬时栖息在离湖较近的盐沼地以及内陆的咸水湖区。

冬时偶见的迷鸟,无经济价值。

Anser ruficollis Pallas, 1769, Spic. Zool. 6: 21 (模式产地: 西伯利亚的鄂毕河下游)。