

16. 埃及雁 *Alopochen aegyptiaca* (Linnaeus)

别名：秃雁。

地理分布 曾于1866年5月偶见于北京附近为迷鸟；余见属的分布。

鉴别特征 体型和赤麻鸭相似，但较大些。头白色，眼周栗色，嘴淡红色；翅上覆羽全白色，和黑色的初级飞羽及栗色的次级飞羽形成鲜明对照，特别易于识别。

形态 雄性成鸟：嘴基羽毛及眼周栗色；额、头顶、颊及喉白色，至后头及颈转为褐色；后颈基部栗色；上背灰而带浅淡的锈色，并满布以十分精细的黑色横斑；肩羽褐色，带皮黄色虫蠹状斑；下背、腰及尾等均蓝黑色；翅上覆羽纯白色，大覆羽具黑色次端斑；初级飞羽和次级飞羽黑色，外羽片绿色而闪紫辉；较长的三级飞羽栗色；胸、两胁淡皮黄色，而带十分精致的褐色横斑，胸部正中处具一栗色块斑；下体余部白色，而具浅灰色虫蠹状细斑；尾下覆羽桂红色；翅下覆羽及腋羽白色。

雌性成鸟和雄鸟相似，但体形略小。

此雁在国内无生态资料的记载。

Anas aegyptiaca Linnaeus, 1766, Syst. Nat., ed. 12, 1:197 (模式产地：埃及)。