

3. 大金丝燕 *Aerodramus maximus* (Hartert), 1892

英文名: Black-nest Swiftlet, Lowe's Swiftlet。

地理分布 国内仅见于西藏南部不丹边界上。国外则分布于从东不丹向南至印度尼西亚, 包括马来西亚和泰国。

鉴别特征 尾很少分叉, 几乎平尾; 跗蹠具稠密的羽毛。

形态 (依据 de Schauensee, 1984)

成鸟 与短嘴金丝燕十分相似, 但在野外极易区别。大金丝燕的尾很少分叉, 几乎平尾; 翼较宽; 跗蹠具稠密的羽毛, 而短嘴金丝燕则为稀疏的羽毛。

量衡度 (mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
		140		122—136		

亚种分化 本种没有亚种分化。

分类讨论 此种曾叫 *Collocalia lowi robinsoni*; *Aerodramus* 属是最近从 *Collocalia* 属分离出来的。

生态 在西藏, 曾在 2150 m 和 3000 m 的山坡上获得记录。在国外分布区南部, 它们则栖息于海岸岛屿上。

经济意义 此种鸟在国内太稀少, 无什么经济价值, 但具有较大的学术意义。

Collocalia maxima Hartert, 1892, Cat. Bds. Brit. Mus., 16: 503.

Collacastia lowi robinsoni Siresemann, 1931, Bull. Raffles Mus., 6: 83, 98; Peters, 1940, 222.

Aerodramus maximus de Schauensee, 1984, 277.