

5. 灰喉针尾雨燕 *Hirundapys cochinchinensis* (Oustalet), 1878

英文名: Grey-throated Spinetail Swift, White-vented Spinetailed Swift.

地理分布 繁殖在海南岛以及以南岛屿。国外广泛分布于东南亚。

鉴别特征 额和喉烟灰色, 翼长不及 185 mm, 尾羽羽干突出成刺状。

形态 (依据《海南岛的鸟兽》, 1983。)

成鸟 额、头顶、后颈、头侧、两翼、尾上覆羽和尾羽黑色而闪蓝辉, 枕部且沾有烟灰色, 初级飞羽和次级飞羽内羽片为淡褐色, 三级飞羽的内羽片具白斑, 飞翔时, 形成长椭圆形翼斑。肩、背至腰为褐灰色。额与喉烟灰色。前颈、胸、腹、两胁、翼下覆羽和腋羽等均为暗褐色。肛周至尾下覆羽白色。

虹膜暗褐色; 嘴黑; 跗蹠和趾红褐色, 爪黄褐色而透明。

量衡度 (mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂(1)	95	190	10	168	53	20

生态 栖息环境、习性等与白腰雨燕相似, 但其飞行迅速, 是鸟类飞行速度较快的一种。

经济意义 据《海南岛的鸟兽》作者说, 多年调查, 此鸟极少遇见, 仅于 1962 年 10 月在乐东采得 1 号标本, 所以本种在国内是非常罕见的, 应对它进行保护, 在学术上也具有重要的意义。

Chaetura cochinchinensis Oustalet, 1878, Bull. Soc. Philom. Paris, (7) 2: 52 (越南: 西贡).

Hirundapys cochinchinensis; Peters, 1940, 4: 232; 郑作新, 1976, 326.