

## 1. 爪哇金丝燕 *Aerodramus fuciphaga* (Thunberg), 1818

英文名: Thunberg's Swiftlet, Edible-nest Swiftlet.

地理分布 国内见于海南岛。国外广泛分布于东南亚。

鉴别特征 上体黑褐色, 腰部有一淡色腰斑; 下体灰褐色。

形态 (依据海南标本。)

成鸟 两性相似。上体黑褐色, 翅、尾及头顶稍暗, 背部羽毛隐具灰白色, 腰羽浅灰褐色, 形成一道淡色腰斑。下体灰褐色。

虹膜暗褐; 嘴细弱, 向下弯曲, 为黑色; 跗蹠裸露, 为紫红色(剥制后成鸟为褐色)。

量衡度 (mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
1 ♂	14	120	5	106	55	9
1 ♀	13	120	5	108	50	9

亚种分化 本种有 2 亚种, 见于我国仅 1 亚种。

### (1) 海南亚种 *Aerodramus fuciphaga* ? *germani* Oustalet

海南万宁县大洲岛。国外见于泰国南部, 马来半岛, 印度尼西亚, 菲律宾和中南半岛三国。

*Collocalia Germani* Oustalet, 1878, Bull. Soc. Philom. Paris, (7), 2, 1878, p. 1 (越南 Condor Is.).

*Collocalia inexpectata germani*; Peters, 1940, 4: 223.

生态 它们终日过着飞翔的生活, 几乎很少休息, 沿着海岸、岛屿飞行捕食飞虫。飞行姿态不像家燕那样作急剧的转折, 这是因为它们的尾羽不呈叉状的缘故。繁殖期在 4—6 月。作半透明塑胶碟状巢于崖隙或岩洞中, 每窝产卵两枚。

经济意义 本来数量已经稀少, 由于历年采窝, 此鸟已近灭绝。

*Hirundo fuciphaga* Thunberg, 1818, Kongl. Ver. -Akad. nya Handl. 83: 153 (Java, Indonesia).