

29. 大金背啄木鸟 *Chrysocolaptes lucidus* (Scopoli), 1796

英文名: Large Golden-backed Woodpecker, Crimson-backed Woodpecker, Greater Flame-backed Woodpecker.

地理分布 我国仅见于云南。国外分布较广, 见于印度、尼泊尔、孟加拉、斯里兰卡、缅甸、泰国、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、越南、老挝、柬埔寨和菲律宾诸岛等地方。

鉴别特征 鼻孔裸露, 背羽金橄榄色而无斑; 有羽冠, 颈后面白色, 腰红色。

形态 (根据云南亚种, 标本采自云南南部。)

头顶及冠羽深红色, 后颈白色; 背、肩及翅(除初级飞羽及外侧覆羽暗褐色而有白点斑外)全橄榄色; 腰深红色; 尾上覆羽及尾黑色。有一道白眉纹并一宽黑的眼后纹延至颈侧。颊、颏、喉白, 有5道狭形黑横斑; 下体余部暗白色, 各羽有黑色边缘(在胸处较宽, 腹处最细)。

雌鸟全头顶及羽冠黑色缀以白点, 其余同雄鸟。

幼鸟头色似雌鸟。雄者头顶红色很快出现, 渐至羽冠。

虹膜红黄色; 嘴石板灰色; 跗蹠和趾淡绿褐色。

量衡度 (mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (8)	244.2 (190—252)	327.2 (296—350)	53.4 (44.6—59)	174.5 (165—185)	103.0 (98—106)	33.0 (31—34.8)
♀♀ (4)	197.5 (177—224)	314.0 (308—322)	50.6 (45—54)	173.5 (172—175)	105.2 (101—111)	32.6 (31—34)

亚种分化 大金背啄木鸟有13个亚种, 而在国内分布仅1个亚种。

(1) 云南亚种 *Chrysocolaptes lucidus guttacristatus* (Tickell)

云南西部潞西、西南部耿马、南部思茅和西双版纳(留鸟)。国外分布于孟加拉, 印度比哈尔和阿萨姆, 缅甸, 泰国, 中南半岛中部和南部。

Picus gullacristatus Tickell, 1833, Journ. As. Soc. Bengal, 2: 578 (印度: Borabhum and Dholbhum, Bihar).

Chrysocolaptes lucidus guttacristatus Peters, 1948, 6: 226; 郑作新, 1976, 380.

生态 单个或成对栖于海拔1400 m左右的干、湿性雨林或常绿阔叶林中。主要以蠕虫为食, 兼吃树果。

经济意义 此鸟数量十分稀少, 属濒危动物, 应加以保护。从生物多样性角度出发, 亦应加以保护。

Picus lucidus Scopoli, 1796, Del. Flor. et Faun. Inubr., 2: 89 (菲律宾: Mindanao).