

2. 斑姬啄木鸟 *Picumnus innominatus* Burton, 1836

别名：打木。

英文名：Speckled Piculet.

**地理分布** 终年留居长江以南各省，西至四川、云南，北抵甘肃南部、陕西南部及河南南部。国外分布于印度，尼泊尔，缅甸，泰国，越南，老挝，马来西亚，印度尼西亚等地。

**鉴别特征** 我国啄木鸟类中最小的一种。额金黄色，头顶和枕橄榄绿色，眼上有一粗大的白色纵纹，一直延伸头至颈；背、腰黄绿色；下体灰白带黄，各羽均有黑色大圆斑。

**形态** (依据云南亚种，标本采自云南小勐养和临沧。)

**雄性成鸟** 额金黄色，头顶和枕橄榄绿色，眼上有一粗大的白色纵纹，一直延伸至颈；背、腰、尾上覆羽黄绿色；中央一对尾羽左侧那枚的外羽片黑色，内羽片白色，右侧那片内羽片白色，外羽片黑色，这样，相邻两羽片都是白色，侧都是黑色；其余尾羽为黑色。飞羽黑褐色，各羽的外羽片具黄绿色羽缘，与背同一颜色，越往里羽缘越宽。下体的颈灰白色；喉、前颈、胸、腹、尾下覆羽两肋灰白带黄，每片羽毛都有黑色大圆点，但两肋则为黑色宽阔横斑。

**雌性成鸟** 额无金黄色，而是和头顶等一样为橄榄绿色，其余与雄鸟同。

虹膜红褐色；嘴黑色；跗蹠和趾暗铅色，爪黑褐色。

**量衡度** (mm, g)

| 性别    | 体重                | 全长                | 嘴峰                  | 翅               | 尾                   | 跗蹠                  |
|-------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| ♂♂(8) | 12.8<br>(11—14.5) | 102.6<br>(96—108) | 11.9<br>(11.2—12.3) | 57.2<br>(52—63) | 31.4<br>(30—35)     | 13.3<br>(12.6—13.5) |
| ♀♀(8) | 12.1<br>(11—13)   | 103.2<br>(92—112) | 11.9<br>(11—12.3)   | 57.5<br>(55—60) | 31.4<br>(12.2—13.3) | 12.9<br>(12.2—13.3) |

**亚种分化** 斑姬啄木鸟有 5 个亚种，见于我国的有 3 个。

**亚种检索表**

头顶暗橄榄褐色 (雄鸟的头顶前部呈橙棕色)；胸以下沾绿黄色 ..... 云南亚种 *P. i. malayorum*




图 24 斑姬啄木鸟 *Picumnus innominatus* 分布图  
1. 指名亚种 *P. i. innominatus* ○; 2. 云南亚种 *P. i. malayorum* □; 3. 华南亚种 *P. i. chinensis* ●。

头顶较淡沾绿色 ..... 指名亚种 *P. i. innominatus*

头顶纯淡栗色；胸以下近白色 ..... 华南亚种 *P. i. chinensis*

**(1) 指名亚种 *Picumnus innominatus innominatus* Burton**

国内仅见于西藏东部墨脱。国外见于尼泊尔、锡金到印度东部阿萨姆。

上体为鲜橄榄黄或光亮的金黄色；下体黄色也较云南亚种为深，而黑斑却较之浅淡。上体辉亮，渲染橙色。

*Picumnus innominatus* Burton, 1836 (1835), Proc. Zool. Soc. London, 154 (锡金).

*Picumnus innominatus innominatus* Peters, 1948, 6: 97.

**(2) 云南亚种 *Picumnus innominatus malayorum* Hartert**

终年留居云南西部盈江和潞西、西南部耿马和沧源、南部思茅和西双版纳以及东南部。在国外见于印度东部，缅甸东部，泰国，越南，老挝，马来西亚，苏门答腊和加里曼丹等地。

形态和量衡度见种的描述。

*Picumnus innominatus malayorum* Hartert, 1912, Vog. pal. Faun., 2: 937 (马来半岛: Gounong Ijau); Peters, 1948, 6: 97; 郑作新, 1976, 356.

**(3) 华南亚种 *Picumnus innominatus chinensis* (Hargitt)**

见于长江以南各省，西至四川峨眉山、雅安及云南西北部，北抵甘肃南部、陕西南部及河南南部桐柏山。国外只见于越南东北部。

头顶全为淡栗色，上体沾棕，两翼表面尤为显著，下体的黑斑也较粗著。头顶暗栗，背面橄榄绿色。

*Vivio chinensis* Hargitt, 1881, Ibis, 228, 图版 7 (浙江梅溪).

*Picumnus innominatus chinensis* Peters, 1948, 6: 97; 郑作新, 1976, 356.

**生态** 栖息于山地灌丛、竹林间。喜在枯树上活动。常单个或成对与鸫、山雀等小鸟于竹林或乔木林中的亚乔木上混合活动，攀缘于低矮的小树和灌丛的枝条上。形小而行动敏捷，不易遇见。啄木节奏较其他啄木鸟慢。食物主要是蚁类及蚁卵等。在秦岭，于 8—9 月间剖验 5 个鸟胃，除一胃内还见些甲虫外，其余都是蚂蚁。李桂垣等 (1985) 在四川解剖过 11 个鸟胃，食物有甲虫 (7 次)、蚂蚁和其他昆虫 (各 3 次)，均为动物物质。

巢营于树洞中。

**经济意义** 此鸟啄食害虫，对人类有益。

*Picumnus innominatus* Burton, 1836 (1835), Proc. Zool. Soc. London, 154 (锡金).