

3. 白眉棕啄木鸟 *Sasia ochracea* Hodgson, 1836

英文名: Rufous Piculet, White-browed Rufous Piculet, White-browed Piculet.

地理分布 终年留居我国云南及广西。在国外, 分布于印度, 尼泊尔, 锡金, 孟加拉, 缅甸, 泰国, 越南和老挝。

鉴别特征 也是我国最小啄木鸟之一, 实际上它比斑姬啄木鸟还小。全身为金黄色, 眼上有一白色眉纹。

形态 (依据云南亚种描述, 标本采自云南勐腊和小勐养。)

成鸟 额金黄色, 头顶和枕橄榄绿色; 眼上有一白色眉纹, 一直延伸至颈侧; 翕、背、腰、尾上覆羽也和额一样, 但稍暗, 尾羽黑色; 翼黑褐色, 每片羽毛的外羽片具橄榄黄色羽缘, 越往里橄榄黄色越宽。整个下体, 包括颈、喉、前颈、胸、腹、尾下覆羽和两胁为亮金黄色, 其色泽介于额与背的颜色之间。

虹膜红色, 眼周裸露处暗红色; 嘴淡黑色, 先端较淡, 嘴喙淡黄色; 跗蹠和趾红色, 爪肉色。

量衡度 (mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(2)	8—9	88—90	13.2	53—57	20—22	11.6—12.2
♀♀(4)	9.3	85.2	13.3	53.5	19.5	11.8
	(8—12)	(82—90)	(12.8—13.6)	(53—54)	(18—21)	(11.1—12.2)

亚种分化 白眉棕啄木鸟有 4 个亚种, 而分布于我国的有 3 个。

亚种检索表

- 上下体羽色最暗浓 广西亚种 *S. o. kinneari*
- 上下体羽色较暗浓 指名亚种 *S. o. ochracea*
- 上下体羽色最差淡 云南亚种 *S. o. reichenowi*

(1) 指名亚种 *Sasia ochracea ochracea* Hodgson

国内仅见于西藏东部墨脱。在国外, 喜马拉雅山脉, 从印度北部往东经尼泊尔、不丹到印度东部的阿萨姆。

和云南亚种相比, 此亚种上体羽色较暗, 下体呈深的赤褐色, 而非橙棕色。

Sasia ochracea Hodgson, 1836, Journ. As. Soc. Bengal, 5: 778 (尼泊尔).

Sasia ochracea ochracea Peters, 6: 98—99.

(2) 云南亚种 *Sasia ochracea reichenowi* Hesse

分布于云南西部盈江、西南部耿马和孟连、南部西双版纳。在国外见于缅甸, 泰国北部和东部, 老挝和越南等。

形态和量衡度见种的描述。

Sasia ochracea reichenowi Hesse, 1911, Orn. Monatsb., 19: 181 (缅甸); Peters, 1948, 6: 99; 郑作新, 1976, 356.

(3) 广西亚种 *Sasia ochracea kinneari* Stresemann

见于云南东南部蒙自、屏边、河口和广西。国外分布于越南北部。

上、下体的颜色, 均较云南亚种深暗。

Sasia ochracea kinneari Stresemann, 1929, Journ. Orn., 77: 335 (广西瑶山); Peters, 1948, 6: 99; 郑作新, 1976, 356.

生态 常单个或成对活动于竹林、河滩或山边的芦苇等处, 多在小树丛的树干上螺旋式攀缘上升, 有时也与普通鸟类一样栖立于枝上。食物为蠕虫。

经济意义 食物为蠕虫, 对人类有益, 应该给以保护。从生物多样性角度出发, 也应给予保护。

Sasia ochracea Hodgson, 1836, Journ. As. Soc. Bengal, 5: 778 (尼泊尔).