

16. 白腹黑啄木鸟 *Dryocopus javensis* (Horsfield), 1821

英文名: White-bellied Black Woodpecker, White-bellied Woodpecker.

地理分布 国内仅在四川和云南见到。国外则分布于朝鲜, 印度, 缅甸, 泰国, 中南半岛三国, 马来西亚, 印度尼西亚和菲律宾等地。

鉴别特征 此鸟的额、头顶、枕、羽冠鲜红色, 腰、腹、两胁雪白色, 身体的其余部分全为深黑色。

形态 (依据西南亚种描述, 标本采自四川西南部盐源。)

雄性成鸟 额、头顶、枕、羽冠鲜红色, 下嘴基部处有一暗红色粗纹延至眼下稍后处; 腰、腹、两胁为雪白色, 但腹部有点乳白; 初级飞羽末端有点黄白; 身体其余部分




图 30 黑啄木鸟 *Dryocopus martius* 及白腹黑啄木鸟 *D. j. javensis* 分布图
 1. 黑啄木鸟 *Dryocopus martius* 指名亚种 *D. m. martius* ○; 2. 西南亚种 *D. m. khamensis* ●; 3. 白腹黑啄木鸟西南亚种 *D. j. forresti* ○。

全为深黑色。

雌性成鸟 与雄鸟相似, 下嘴基部处无暗红色斑, 为黑色; 初级飞羽末端无黄白斑, 而是全黑色, 其余和雄鸟同。

虹膜 淡黄色或灰白色; 嘴粉绿色 (尖端暗); 足及爪深褐灰色。

量衡度 (mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂ (2)	290, 311	440, 454	54.6, 57.4	234, 270	157, 170	34, 34.6

亚种分化 白腹黑啄木鸟分化为 15 个亚种, 而在我国仅有一个。

(1) 西南亚种 *Dryocopus javensis forresti* Rothschild

四川西南部, 云南西北部向南至西双版纳 (留鸟)。国外分布于越南北部。

形态和量衡度见种的描述。

Dryocopus forresti Rothschild, 1922, Bull. Brit. Orn. Cl., 43: 9 (云南澜沧江流域)。

Dryocopus javensis forresti; Peters, 1948, 6: 152; 郑作新, 1976, 366.

生态 栖于山地针叶林或常绿阔叶林内, 食物为昆虫。

经济意义 此鸟数量十分稀少, 属濒危动物, 应加以保护。又此鸟食虫, 对人类有益, 同样亦应加以保护。

Picus Javensis Horsfield, 1821, Trans. Linn. Soc. London, 13: 175 (印度尼西亚: 爪哇)。