

## 9. 红颈啄木鸟 *Picus rabieri* (Oustalet), 1898

英文名: Rabier's Woodpecker, Red-collared Woodpecker.

**地理分布** 在我国仅见于云南东南部河口。国外也只在越南和老挝有分布。

**鉴别特征** 额暗灰而沾绿色, 眼先淡红棕色, 头侧余部淡绿色, 头顶至后颈深红色。自后颈沿左右两侧向下至胸部中央, 有一深红白色的领状圈。上体包括肩羽和两翼的小覆羽均辉浓绿色。下体基本为绿色。

**形态** (依据郑作新等, 1957, 中国鸟类新纪录, 动物学报, 9 (1): 39—40。)

**雄性成鸟** 额暗灰而沾绿色。眼先淡红棕色, 头侧余部淡绿色。头顶以至后颈大概深红色, 各羽基羽基部主要为暗灰色, 近红色羽端处复缀以黑色细点; 这些暗灰和黑色部分往往显露在表面。自后颈沿左右两侧向下至胸部中央, 有一深红色的领状圈, 不过在胸部红色较淡而沾有褐色, 且圈纹在此也较宽阔。自嘴基至红色的颈圈处有一颧纹, 微呈污灰色, 而其后部亦散缀以深红色。上体包括肩羽及两翼的小覆羽大概辉浓绿色, 背羽基部的暗灰色往往露出。翼上的中和大覆羽与背羽同, 但沾黄铜色光泽。小翼羽和初级覆羽均黑褐色, 羽缘稍淡, 并沾绿色; 小翼羽的外羽片更具一些小形的白色横斑。翼缘白色, 微缀以褐色细点。飞羽大都黑褐, 初级飞羽的内外羽片均杂以白斑。次级飞羽的内羽片亦然; 位于外侧的次级飞羽在外羽片上也微有淡色斑。所有次级飞羽的外缘均转为黄铜绿色, 与外侧覆羽一样。尾羽黑褐色, 羽干粗硬; 中央一对的内羽片微具淡色的短横斑; 表面各对的羽基外缘并狭缀以黄褐色。

颈和喉绿白色, 喉上略有些白纵纹。胸以上为绿色, 向后渐淡, 在腹部微杂以白色和较浓绿色的细斑。两胁亦绿色, 羽轴缀以白色和灰色, 羽缘淡绿而沾黄色。尾下覆羽绿褐色。腋羽和翼下覆羽白色, 而满布以黑褐色粗斑。

嘴黑色, 下嘴基部黄绿色; 跗蹠和趾灰绿色。

**量衡度** (mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂(1)	—	302	36	137	112	30

**生态** 活动于开阔林地、竹林等, 也常见在地面。食物为昆虫、浆果。

**经济意义** 此鸟羽色艳丽, 可供观赏。此种鸟数量非常稀少, 属濒危动物, 应加以保护。

*Gecinus rabieri* Oustalet, 1898, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 1: 12 (越南北部: Chobo).

*Picus rabieri* Peters, 1948, 6: 138; 郑作新, 1976, 360—361.