

23. 纹胸啄木鸟 *Picoides atratus* (Blyth), 1849

英文名: Stripe-breasted Pied Woodpecker, Stripe-breasted Woodpecker。

地理分布 我国仅在云南西部、南部和东南部见到。国外也只在印度缅甸边界, 缅甸, 泰国和老挝见到。

鉴别特征 上体黑有白斑; 下体有黑纵纹, 翅长 110 mm。

形态 (依据云南标本。) 头顶及项深红色, 上体余部黑色, 背中部有白色相间横斑; 翅黑而有白点斑; 尾黑色, 外侧尾羽具白横斑。下体喉部污白色, 余部淡黄棕色而有浓著的黑条纹; 尾下覆羽深红色。雌鸟仅以头顶及项黑色而非红色区别于雄鸟。

虹膜棕红 (♂) 和褐色 (♀); 嘴角灰, 下嘴较淡; 跗蹠和趾暗铅色, 爪暗褐色。

量衡度 (mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(4)	50.4	207.5	25.9	116.7	74.0	18.2
	(45—53.5)	(196—223)	(24.3—27)	(115—118)	(70—78)	(18—18.7)
♀♀(5)	50.0	212.2	26.1	117.2	77.8	19.0
	(47—54)	(203—220)	(24.6—27)	(112—120)	(76—80)	(18—20)

生态 多单个、成对或数只活动于灌丛或阔叶乔木上。食物为浆果、鳞翅目幼虫及鞘翅目昆虫。

经济意义 以虫为食, 对农林有益。

Picus atratus Blyth, 1849, Journ. as. Soc. Bengal, 18: 803 (缅甸: Tenasserim).

Dendrocopos atratus Peters, 1948, 6: 193—194; 郑作新, 1976, 374.