

12. 金背三趾啄木鸟 *Dinopium javanense* (Ljungh), 1797

英文名: Golden-backed Three-toed Woodpecker, Common Gold-backed Woodpecker。

地理分布 在我国仅见于云南中部景东, 南部西双版纳。国外广泛分布于印度, 缅甸, 泰国, 马来西亚, 印度尼西亚, 菲律宾以及中南半岛三国。

鉴别特征 额、头顶、枕及羽冠黑色, 背金黄色沾橙黄色, 腰鲜红色。足仅具三趾。

形态 (依据云南亚种, 标本采自云南橄榄坝。)

雌性成鸟 额、头顶、枕、羽冠黑色, 每片羽毛的内羽片具白色羽缘; 眼上和眼下各有一粗大的白色纵纹至颈; 眼后也有一条粗大的黑色纹至颈; 眼下白色纵纹之下还有一条粗大的黑色纵纹; 背金黄色, 渲染橙红色; 腰鲜红色; 尾羽黑色; 飞羽黑褐色, 次级飞羽的外羽片带绿的金黄色, 覆羽也是带绿的金黄色, 和次级飞羽的外羽片一样。下体的颊、喉沾土黄的白色, 中央有一粗大的黑色纵纹; 胸、腹、两胁为沾黄的白色, 胸部羽毛边缘或某一部分黑色, 腹和两胁的羽毛则具黑色人字斑。

虹膜棕褐色; 嘴黑色。

量衡度 (mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♀(1)	108	307	35.2	146	95	24.8

亚种分化 金背三趾啄木鸟分化为 7 个亚种, 而在我国的仅 1 个亚种。

(1) 云南亚种 *Dinopium javanense intermedium* (Blyth)

此亚种的国内分布与种相同。国外见于印度阿萨姆, 缅甸, 泰国, 中南半岛三国。

Picus (Tiga) intermedium Blyth, 1845, Journ. As. Soc. Bengal, 14: 193 (尼泊尔, 实属错误; 应为缅甸: Arrakan).

Dinopium javanense intermedium Peters, 1948, 6: 145; 郑作新, 1976, 363.

生态 栖于海拔 1500 m 以下的常绿阔叶林或混交林内。食物为昆虫和蠕虫。

经济意义 吃虫, 对森林有益。

Picus javanensis Ljungh, 1797, K. Vet. Akad. Nya Handl., 18: 134 (印度尼西亚: 爪哇)。