

7. 鳞喉啄木鸟 *Picus xanthopygaeus* J. E. et G. R. Gray, 1846

英文名: Little Scaly-bellied Green Woodpecker, Scaly-throated Woodpecker。

地理分布 我国仅见于云南西部。在国外,分布于印度,斯里兰卡,尼泊尔,锡金,缅甸,泰国,越南和柬埔寨。

鉴别特征 喉、胸、腹均有 U 形鳞状纹。头顶红色;背和翼上覆羽草绿色;腰部亮黄色;尾羽绿褐色;下体的颊、喉黄灰色;前颈和胸绿色;胁和尾下覆羽淡绿黄色。

形态 (据杨岚等, 1995。)

雄性成鸟 头顶红色, 头顶后部羽毛有时具橙色先端, 枕部有黑显露; 背及翼上覆羽草绿色, 有时渲染黄色, 有时较多橄榄色; 腰部亮黄色, 极少渲染橙色; 初级飞羽暗褐色, 外羽片和内羽片基部具白斑; 最内侧次级飞羽染浓绿色, 并具不明显的绿黄色横斑, 外侧飞羽逐渐与初级飞羽趋于同色; 尾羽绿褐色, 在基部有不明显白斑, 最外侧尾羽浅褐, 整片羽毛均具较宽阔斑纹; 眼至枕部具一白色眉纹, 其上方有一黑纹; 眼先暗黄白色; 耳羽淡灰褐色, 具较白的纵纹; 两颊灰白具不明显的黑色纵纹; 颊、喉黄灰色, 具白色纵纹; 前颈及胸部绿色较多, 具不太明显的暗色鳞状纹; 胁及尾下覆羽淡绿黄色, 具宽阔的黑色鳞片状纹。下体羽色变化较大。

虹膜红色, 具一粉红色外圈; 嘴峰角黄色, 上嘴较暗较褐; 跗蹠橄榄绿或橄榄灰色。

量衡度 (mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
		300		122—130		

生态 栖于开阔山地桦树林、竹林中, 常至地面活动。食物为昆虫。

经济意义 此鸟自 1926 年 Rothschild 报道采自腾冲以后, 一直未见该种在中国报道, 在云南亦未采到标本, 所以此种是中国的罕见种, 应好好加以保护。

Picus striolatus Blyth, 1843, Journ. As. Soc. Bengal, 12: 1000 (喜马拉雅山及印度中部); nec *P. striolatus* Lesson, 1831, nor of MacGillivray, 1840.

Picus xanthopygaeus Peters, 1948, 6: 134—135; 郑作新, 1976, 358.