

5. 鳞腹啄木鸟 *Picus squamatus* Vigors, 1831

英文名: Scaly-bellied Green Woodpecker, Scaly-bellied Woodpecker.

地理分布 我国仅见于西藏西南部的吉隆。在国外, 分布于从外里海向东经阿富汗、巴基斯坦、印度北部至锡金。

鉴别特征 雌鸟头顶和羽冠灰黑; 眼先和眉纹白; 上体余部基本为绿色。下体基本也绿色。

形态 (依据指名亚种, 据郑作新等, 1983, 西藏鸟类志, 144。)

雌性成鸟 头顶和羽冠灰黑; 眼先和眉纹白; 上体余部和两翅覆羽均绿, 杂以黑色横斑; 初级飞羽暗褐色, 外羽片镶嵌一系列白斑; 尾羽浅黑褐, 两羽片均镶有一系列棕褐斑。颊、喉浅绿, 下体余部浅绿, 并具较粗的黑色鳞状斑。

雄鸟 (据 Baker, 1927) 头顶及枕深红色, 有白眉纹及眉纹上黑纹, 黑髭纹头颈侧近白至淡绿色, 背、肩及翼上覆羽灰草绿色; 腰及尾上覆羽绿色缘以亮黄色, 尾羽淡黑褐色, 有白横斑, 初级飞羽暗褐而有白横斑, 三级飞羽沾绿色而有模糊的棕绿色斑。

下体颊、喉淡灰绿色, 至胸部稍暗色, 腹以下淡黄绿色。

虹膜红色, 外圈淡粉红; 嘴角黄色; 跗蹠及趾黄绿至灰黄绿色。

量衡度 (mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♀(1)	150	301	39	150	113	26.5

分类讨论 本亚种与印度、阿富汗的 *P. s. flavirestris* 相较, 区别在于后者羽色更浅淡, 下体鳞斑较浅、较宽。

亚种分化 鳞腹啄木鸟分化为两个亚种, 而在我国只有 1 个亚种。

(1) 指名亚种 *Picus squamatus squamatus* Vigors

国内仅见于西藏西南部吉隆。国外分布于喜马拉雅山脉从克什米尔到锡金。

形态和量衡度见种的描述。

Picus squamatus Vigors, 1831, Proc. Zool. Soc. London, (1930): 8 (印度 Simla-Almora distric).

Picus squamatus squamatus Peters, 1948, 6: 133; 郑作新, 1976, 358.

生态 常活动于栎树和针叶树等常绿混交林中。一般是在树干上攀缘、跳跃式上升。有时也作螺旋攀登, 搜寻食物; 不时地用嘴敲击、刺探隐居树洞中的害虫。它也和灰头啄木鸟一样, 常下到地上啄食蚁类。分析胃有蚂蚁数只, 鞘翅目碎片等。

经济意义 此鸟数量稀少, 它们嗜食害虫, 对人类有益, 应加以保护。

Picus squamatus Vigors, 1831, Proc. Zool. Soc. London, (1930): 8 (印度 Simla-Almora distric).