

### 38. 藏雀 *Kozłowia roborowskii* (Przevalski)

英文名: Tibitana Rosefinch.

地理分布 藏雀为我国特产鸟类之一, 分布范围见属的记述。

鉴别特征 雄鸟全体粉红色, 颇似朱雀, 头与颊深红色, 项及喉部具银白色点斑; 雌鸟与雄鸟同型, 但无一点红, 上体和颈到胸具宽阔的斑纹。

#### 形态

雄性成鸟: 头上部洋红, 项部具银白色斑点; 头侧和喉部呈发黑的鲜红色, 喉部尚具大形三角形银白色点斑; 后颈、背部、肩部及翼上覆羽具洋红色羽缘, 而肩部和翼上覆羽主为淡褐色; 初级飞羽褐色, 具粉色羽缘, 内侧几枚较宽, 且羽端灰白; 次级飞羽与初级飞羽的颜色相近, 尾羽褐色, 外缘具粉色, 最外一对具白色羽缘; 尾上及尾下覆羽粉色; 后肋羽毛有几条显著长而发黑的横斑; 腋羽及翼下覆羽白色, 羽缘粉色, 护腿羽白色。

虹膜暗榛子色; 嘴暗角色, 两嘴其部较暗; 脚褐色。

量度:

性别	体长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂ (1)	168	13.5	123	90	21

生态 藏雀栖于海拔4000—5400m间的荒芜、多岩石的高山旷野、高山草地和山坡的小灌木间, 冬季才稍微向低处迁移一些。单独或成对活动, 偶尔成家族群, 但很少成成群。它有一种快速而优美的, 像蓝大翅鸫 (*Grandala coelicolor*) 的飞行姿态。短的腿使它在地上行走时, 有一种相当拖曳的步态。在长有少量植物的地上取食; 食物主要是高山草本植物的种子和碎片。一般不爱鸣叫, 但有一种短促而稍带哀伤, 不过很悦耳的哨声, 并常常以一种颤音来回重复。




图 68 藏雀 *Kozłowia roborowskii* ● 分布图

经济意义 藏雀数量很少, 而且分布区极窄, 是我国特产鸟类之一, 有很高的学术价值, 但经济意义不大。

*Leucosticte roborowskii* Przevalski 1887, Ibis (5) 5: 411 (模式产地: 青海布尔罕布达山脉)。