

4. 金喉拟啄木鸟 *Megalaima franklinii* (Blyth), 1842

英文名: Golden-throated Barbet.

地理分布 留居于我国西藏东南部、云南及广西西南部。国外分布于尼泊尔、锡金、缅甸、泰国、越南、老挝、马来半岛等地的高山地带。

鉴别特征 额和后颈中部鲜红色，头顶金黄色，头的两侧具粗大的黑色过眼纹；上体余部深绿色。下体的颊、喉蛋黄色，前颈白色，其余下体浅绿色。

形态 (依据指名亚种，标本采自云南潞西。)

成鸟 额和后颈中部鲜红色，头顶金黄色，头的两侧具粗大的黑色过眼纹，从嘴峰至后颈止，耳羽白色或灰白色。背、腰、尾上覆羽、尾羽深绿色；飞羽黑色，除前2片飞羽外，最初几片初级飞羽外羽片基段深蓝色，后几片初级飞羽和次级飞羽的外羽片则为鲜绿色。下体的颊、喉蛋黄色，两边嘴角红橙色，前颈及其两侧白色，胸、腹、尾下覆羽、体的两侧浅绿色。

虹膜褐色；嘴淡蓝黑色；跗蹠及爪灰绿色。

量衡度 (mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (6)	81.8	216.8	23.2	98	58	22.8
	(80—89)	(210—228)	(22.2—23.9)	(97—99)	(54—60)	(22—23.7)
♀♀ (6)	84.6	208.8	22.1	96.5	61	22.8
	(83—90)	(198—220)	(21—24.7)	(95—99)	(57—66)	(22.2—24.1)

亚种分化 金喉拟啄木鸟有5个亚种，见于我国的仅指名亚种。

(1) 指名亚种 *Megalaima franklinii franklinii* (Blyth)

终年留居在西藏东南部墨脱，云南西北部贡山、西部盈江和腾冲、南部西双版纳和屏边及东南部马关等，广西西南部。国外见于尼泊尔，锡金，缅甸北部，越南和老挝的北部等。

形态和量衡度见种的描述。

Bucco Franklinii Blyth, 1842, Journ. As. Soc. Bengal, 11: 167 (印度: Darjeeling).

Megalaima franklinii franklinii Peters, 1948, 6: 35; 郑作新, 1976, 351—352.

生态 生活于阔叶林间，常单个或成对活动，多停息在枝叶茂密的乔木林或亚乔木上。多在晨、昏鸣叫，通常由一只开始，而后引起同伴的鸣叫。叫声宏亮，似“go-o-go”的音韵。在云南西部剖验7只鸟胃，计有甲壳昆虫(5次)、野樱桃果(7次)、蔷薇科植物果(1次)、黄泡果(1次)、其他植物果实(3次)及植物花(2次)。营巢于山林树洞中，一窝卵2—3枚。

经济意义 此鸟羽色艳丽，可供观赏。它嗜食浆果，对植物扩散有益处。从生物多样性角度出发，应予保护。

Bucco Franklinii Blyth, 1842, Journ. As. Soc. Bengal, 11: 167 (印度: Darjeeling).