

2. 角鸬鹚 *Podiceps auritus* (Linnaeus)

英文名: Horned Grebe.

地理分布 在国内,繁殖于新疆天山西部,见于东北中部哈尔滨、南部旅顺,河北、河南、山东等为旅鸟,冬迁长江下游及福建和台湾。国外分布于欧亚洲的中部,北美洲的北部。

鉴别特征 上体大都灰黑色;头的两侧各有一簇金棕色羽毛,耸立像两角一样。

形态 成鸟(夏羽) 额、头顶及后颈均黑;头的两侧各有一个金棕色羽簇,耸立犹如角状;后颈上部两侧具有延长的黑羽,形成皱领;颈、上胸及两胁等均栗红;背部暗灰褐色;内侧飞羽大都白色;下胸及腹等亦白。

量度 (依据 Witherby 等, 1924, vol. 2, p. 455):

性别	嘴峰	翅	跗蹠
♂ (15)	22—27	134—150	44—49
♀ —	20—25	129—145	—

分类讨论 本种原为单型种。Mayr 等 (1979) 把它分为二个亚种:指名亚种在东半球,另一亚种 *Podiceps auritus cornutus* (Gmelin) 在西半球。我国境内仅有指名亚种。

生态 主要栖息于山林间和山坡上的水域中。食物与一般鸬鹚同。在国内非常稀少,经济意义不著。

Colymbus auritus Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1: 135 (模式产地: Finland).