

5. 赤颈鸕鹚 *Podiceps grisegena* (Boddaert)

别名：赤襟鸕鹚。

英文名：Red-necked Grebe.

地理分布 夏时见于黑龙江省哈尔滨、绥化、泰来、齐齐哈尔、佳木斯；迁徙经吉林、辽宁等省以至河北省越冬，有时迁抵福建中部和福州，以及广东珠江口（1月2日）。在国外，分布于欧洲大部分，非洲极北部海岸，亚洲西南部和西伯利亚东部，北美洲北部。

鉴别特征 头顶黑，头侧及喉白，前颈及上胸赤棕色。

形态 成鸟（夏羽）头顶黑，其两侧各有羽簇，形稍延长而向外突出；头部两侧及喉均白；前颈和上胸赤棕色，故名赤颈鸕鹚。后颈、背及两翅均灰褐；下胸、腹以及两翅的内侧飞羽悉白。嘴的基部黄色，余部黑色。

量度（依 Dement'ev 等，1979，p. 319）：

性别	嘴峰	翅
♂ ♀ (37)	40—55	192 (180—206)

分类讨论 本种有2个亚种：指名亚种分布于欧洲；我国的亚种：*Podiceps grisegena holboellii* Reinhardt，其原始文献列下：

Podiceps Holboellii Reinhardt, 1854, Vidensk. Meddel. Baturhist. Foren. Kjobenhava: 76 (Greenland). 据 de Schauensee (1984)，指名亚种亦在新疆西北部繁殖。

生态 主要栖息在低山丘陵和平原地区的各种水域中。善于游泳及潜水。受惊时，就潜入水中，能在水中匿藏较长时间。食物与其他鸕鹚相同。

经济意义 数量稀少，经济意义不著。

Colymbus grisegena Boddaert, 1783, Tab. Pl. enlum. Hist. Nat.: 55 (原未指定模式产地；法国, ex Hartert).