

3. 黑颈鸬鹚 *Podiceps nigricollis* Brehm

英文名: Black-necked Grebe.

地理分布 夏时分布于新疆天山、内蒙古东北部呼伦贝尔盟、东北中部和西南部; 迁徙经东北南部、华北各省, 西抵甘肃、青海、新疆等以至福建、广东、台湾、云南、四川盆地等处越冬。国外见于欧亚洲中部、南部, 非洲的一些地区, 及北美洲西部以至中美洲。

鉴别特征 头、颈及背的极上部均黑, 耳区有一羽簇呈金橙黄色, 非常夺目。

形态 成鸟(夏羽) 额、头顶及颈等均乌黑发亮; 头顶的羽毛稍长些, 羽基亦较阔些; 上背及肩的黑色不如头顶那样深; 上体余部黑褐, 腰侧及下面尾羽栗色而具黑端; 从眼以至耳区有一簇金橙黄色的窄长羽毛。颌和喉均漆黑; 上胸白而杂以栗色; 胸侧及两胁呈栗色与黑色相杂状; 下体余部白而有似丝的光泽。内侧飞羽白色, 飞时尤显, 嘴黑; 下嘴稍向上曲, 与小鸬鹚显然有别。




图18 黑颈鸬鹚 *Podiceps nigricollis* 的分布

量度 (据 Witherby 等, 1924, vol. 2, p. 460):

性别	嘴峰	翅	跗蹠
♂♂ (12)	22—25	127—136	41—46
♀♀—	20—24	124—132	—

分类讨论 本种原称 “*Podiceps caspicius* (ablizl)”, 嗣经国际动物命名委员会于 1956 年审议, 加以废除, 而改用今名 (Intern. Comm. Zool. Nomencl. 13: 121)。

本种计有 4 个亚种, 其中见于国内的, 仅指名亚种。

生态 中国科学院西北高原生物研究所于 1984 年在青海海南沙珠的更朵海, 观察到这种鸬鹚结群活动, 一群约有 20—30 只, 在水中和地面上觅食。翅短不易飞起, 即使飞起也离水面很近, 翅膀在水面上打起水波, 飞行约 10 多米即落下。鸣声如 “bibbib”, “eece”。剖检鸟胃, 内多为昆虫, 还有草籽及水草, 并兼食些鱼、虾等。

Podiceps nigricollis Brehm, 1831, Handb. Naturg. Vög. Deutsch.: 963 (模式产地: 德国中部)。