

30. 棕尾虹雉 *Lophophorus impejanus* (Latham)

地理分布 分布于西藏南部亚东、东南部雅鲁藏布江东部；在国外，分布从阿富汗东至不丹。

鉴别特征 体形较家鸡肥大，雄鸟羽冠长，而具匙状羽端；上体大都呈金属铜绿、紫及绿蓝等色；下背白；尾棕红；下体褐黑。

形态 雄性成鸟：头的上部和两侧呈金属绿色；头顶中部有同色的一小簇冠羽，特形延长，其羽干裸出，并具匙状羽端；颈和喉黑，除中央部以外，均闪着绿辉，边缘更着金属紫色；后颈及颈侧红铜色，向后渐转为背部的铜绿色；前颈黑，两侧有宽阔的绿蓝色边纹，直至胸部；肩羽及附近的翅上覆羽，内侧次级飞羽，腰羽以及较短的尾上覆羽等均呈金属紫色，并多少沾些蓝绿色泽，次级飞羽的羽端并转为金属绿蓝色；下背白，并有多少黑褐色羽干纹；最长的尾上覆羽闪金属绿色；尾棕红，羽端较浓；两翅屈曲处及外侧翅上覆羽为金属蓝绿色；小翼羽、初级飞羽及外侧次级飞羽等均黑褐色，后者外翈边缘沾着金属蓝色；下体褐黑，羽干大都褐白色。

虹膜榛褐色；眼周蓝；嘴角褐色，边缘和先端较淡；脚黄绿以至暗褐绿，变异很大。

雌性成鸟：头及羽冠均黑，羽缘及羽干纹棕黄；颈项相似，但羽干纹较宽阔；背亦黑，各羽具皮黄色或白色羽缘及两条同色纵纹；下背及尾上覆羽皮黄色，而具黑色的同心纹，最长的尾上覆羽并具宽阔白端；尾羽呈棕色和黑色相杂状，也具白端；两翅表面与背相似，但斑杂较著；初级飞羽及外侧次级飞羽暗褐，前者外翈具有棕黄色点斑，而后者外翈则杂以同色横纹；颈、喉及前颈均白；下体余部褐色，上胸及两胁杂以黑纹，下胸和腹具棕白色轴纹；尾下覆羽白，而具黑色和棕色横斑。

量衡度(据德拉科, 1951)：

性 别	体 重	嘴 峰 (从无羽处量起)	翅	尾	跗 跖
♂ ♂	约 2 公斤	约 50—54	289—320	215—235	约 70—80
♀ ♀	约 2 公斤	—	259—287	—	—

生态 栖于山坡上开阔的森林，特别是橡树林、桦树林及杜鹃灌丛间。由于罕见，被视为珍稀鸟类。活鸟可饲养供展览用。

Phasianus impejanus Latham, 1790, Ind. Orn. 2: 632 (模式产地：锡金)。