

27. 灰腹角雉 *Tragopan blythii* (Jerdon) (图版一: 中图 4)

地理分布 分布于西藏东南部;在国外,见于不丹东部及印度阿萨姆。

鉴别特征 体形大小似家鸡;头黑,颈红,上体余部满布以白色和栗赤色眼状斑;腹烟灰色。

形态 (根据西藏亚种的标本)

雄性成鸟:额、头顶、耳羽、颈侧的一块斑,及喉下肉裾的周围等均黑;宽阔的眉纹、后头、颈的全部、上背的极上部、两肩及上胸的上部等深橙红色;上体余部包括两翅的覆羽均黑,而具许多半圈状黄斑,各羽在羽端处有一个缘似橄榄褐和黑色的白色眼状斑,并在次端处有两个也有同样边缘的栗赤色眼状斑;由于羽基的黑色和黄斑被掩盖着而不外显,所以上体显得具有不少白色和栗赤色眼状斑;与指名亚种相较,全部更暗得多,栗赤色眼状斑较沾褐色,白色眼状斑较小,黄斑也较狭窄而不显;最长的尾上覆羽近白,羽缘橄榄褐,并具黑色和红褐色横斑;尾黑而在近羽基处具有不规则的辉黄色横斑;飞羽褐黑,而杂以不完整的黄斑;下胸和腹均烟灰色,各羽的边缘很暗深,而中央部则较淡,全部较指名亚种浅淡得多;两胁、覆腿羽、肛周羽及尾下覆羽等均杂以黑色和黄色斑点,并大都具灰色和红色羽端。

虹膜褐色;嘴角褐色;脸裸出部金黄;头上肉角淡蓝;喉下肉裾黄,而缘以浅蓝色;脚粉红色。

雌性成鸟:上体黑,满布以棕色的各种杂斑,各羽中央处并具“V”字形的黄斑,全部显得较指名亚种为暗;尾色较淡,许多黑色替代以辉棕色;颈和喉白而具褐点,颈几乎无斑;下体及两胁暗褐,杂以深棕及灰白等斑纹,尾下覆羽着色较深而鲜明。

虹膜褐色;嘴角褐色;眼周裸出部近黄;脚肉褐色。

量度:

性别	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂(1)	约 530	19(从额量起)	250	195	76(据德拉科, 1951)
♀(1)	—	33(从头骨量起)	232	155+	—(据阿利等, 1969)

亚种分化 灰腹角雉有 2 亚种,其中之一见于我国西藏南部。

(1) 藏南亚种 *Tragopan blythii molesworthi* Baker

本亚种至今仅采自模式产地。

形态描述见上文。

Tragopan blythii molesworthi Baker, 1914, Bull. Brit. Orn. Cl. 35: 18 (模式产地: 西藏达旺)。

生态 栖于海拔 3,000 米左右高度的山地,很少下降到 2,000 米以下,常匿栖于深林的丛密下木间。

Cerionis blythii Jerdon, 1870, Proc. As. Soc. Bengal: 60 (模式产地: 印度阿萨姆邦纳加山脉)。