

16. 白颊山鹧鸪 *Arborophila atrogularis* Blyth (图版一: 左图 5)

地理分布 国内留居云南省西部盈江地区;在国外,分布于印度和缅甸。

鉴别特征 与海南山鹧鸪和台湾山鹧鸪相似。但额灰褐色;颊和耳羽均乳白且连成一条宽阔的纵带;上胸灰色具大形滴状黑点;胁灰色,渲染橄榄褐色,并具白色羽干纹,纹的末端扩成滴状。两性羽色相似。

形态 雌性成鸟: 额灰褐色,头顶橄榄褐,各羽端黑;眼先和眉纹连成一条黑色纵带,向后伸展至颈,眼下亦有一条黑带,自眼先开始至颈侧与眉纹相遇;紧接眉纹后上方,左右各具一条宽带,前端稍窄呈淡黄白色,向后变宽,呈草黄色而具黑斑;颊和耳羽均乳白,连成一条宽带,耳羽色略暗;背、腰和尾上覆羽均橄榄褐,密杂以有规则的黑色横斑,尾上覆羽横斑较窄而不明显;尾羽亦然,但黑斑曲折而呈不规则形状;翅上覆羽的底色与背同,具粗形黑色横斑,羽端沾栗;初级飞羽与覆羽均暗褐色,羽端略沾淡栗色;次级飞羽黑褐,外翮饰以栗色杂以黑的宽阔边缘;三级飞羽橄榄褐,具黑色粗斑和栗色羽端。颊、喉黑色、羽毛稀疏;喉下有些白羽,但因我们标本的这部分脱羽很多,看不出白色喉领;胸灰色,上胸具放射状的黑色滴状斑;腹灰白至围肛羽毛几纯白;两胁灰色,渲染橄榄褐色,并具白色羽干纹,纹的末端扩成滴状,端缘还杂以黑色;尾下覆羽棕褐,具黑色次端斑,羽端色淡棕褐或几纯白。

虹膜褐或红褐色;嘴暗褐;眼周和喉部裸露皮肤鲜红,在繁殖季节变为鲜艳深红色;脚深蜡黄色。

雄性成鸟: 体色与雌性成鸟相似,但羽色较鲜艳。嘴黑;脚深橄榄色至鲜橄榄红色。

量衡度:

性 别	体 重	全 长	嘴 峰	翅	尾	跗 蹠
♂	—	275	—	135—147	—	(据贝克)
♀(1)	220	245	15	127	56	36.5

分类讨论 白颊山鹧鸪至今尚未发现有亚种分化。

对于白颊山鹧鸪的分类地位尚有争议。有人认为白颊山鹧鸪、台湾山鹧鸪和海南山鹧鸪均应归隶于同一种(森冈弘三,1957)。我们认为三者不应归为一种或二种,而应分属于三个不同种(详见海南山鹧鸪的分类讨论)。

生态 白颊山鹧鸪是本属栖息在低海拔的代表种,通常栖息在 900 米或 900 米以下山地,海拔 1,500 米是它分布最高限;喜在稀疏常绿林中潮湿下木或竹林中生活。群居性,常 5—8 只结群在隐蔽处活动。一般不轻易起飞。

食性与本属其他山鹧鸪相同。

繁殖季节,在平原地区为 3—4 月,海拔较高地区 6—7 月。巢有时为只垫以树叶和杂草的凹穴,周围长着长草覆盖着。每窝产卵 3—5 枚,有时达 7 枚。

为罕见鸟类,经济价值不大。

Arboricola atrogularis Blyth, 1850, Journ. As. Soc. Bengal 18(2). 819 (模式产地: 印度的阿萨姆邦)。