

13. 红胸山鹧鸪 *Arborophila mandellii* Hume (图版一：左图 1)

地理分布 产于我国西藏自治区东南部丹巴江和米许密山一带(留鸟)。在国外，见于锡金、不丹和印度。

鉴别特征 这是一种典型的矮肥的山鹧鸪。背和肩的羽毛不具黑色横斑，不具或仅可稍微见到暗色羽缘。喉部淡橄榄栗色，其下缘具一条黑领清楚地把深栗色胸部隔开。两性体色相同。

形态 眼先、额和头顶前部暗栗色，逐渐转变为头顶后部和后颈上的褐色；眼前部之下具一狭窄的淡黄色条纹；暗灰色眉纹从眼开始向后延伸至后颈而左右相遇；后颈下部和背的极上部淡红栗色，而具黑斑；颈侧棕而杂以黑点；背、腰、尾和尾上覆羽橄榄色，而杂以狭窄的黑色羽缘，除背之外，几乎所有羽毛均具宽阔的中央黑斑；肩和翅上覆羽与背同色，但具较细的黑斑；翼羽褐色；内侧次级飞羽和大覆羽具栗色羽缘，淡灰色块斑及宽阔的黑色端斑。颏、喉等均淡橄榄栗色，后接一个白色块斑与一条黑色领环清楚地与深栗色的上胸隔开；下胸至肛周灰色；两胁具不同程度的栗色，并或多或少地杂以白斑；腹部中央色更淡，有时渲染以灰色；尾下覆羽橄榄色，具白斑和棕色羽端及杂斑。

虹膜褐至红褐色；嘴黑；脚淡红。

量度：

性 别	全 长	嘴 峰	翅	尾	跗 跖
♂(1)	243	15(仅前部)	127	38	38(据休姆 Hume)
♀	—	19—20	133—145	56—68	43—45(据贝克)

生态 栖息在1,300—1,800米或更高的山地，尤喜匿栖在稠密的常绿树林中，叫声是一种响亮、沉重而拉长的，紧接着一系列渐升的双音调，直至最高点，与环颈山鹧鸪很相似，但较清晰。繁殖期在3—6月。

是一种极为罕见的鸟类，经济价值不大。

Arborophila mandellii Hume, 1874, Str. Feath. 2.449 (模式产地：不丹)。