

26. 红胸角雉 *Tragopan satyra* (Linnaeus) (图版一: 中图 5)

地理分布 分布于我国西藏南部春丕山谷及喜马拉雅山北坡; 在国外, 见于尼泊尔、锡金、不丹及印度北部。

鉴别特征 体形较家鸡大些; 头黑; 通体大都绯红, 而满杂以白色眼状斑。

形态 雄性成鸟: 头黑; 羽冠两侧的各一纵纹, 后头的两侧, 后颈的全部, 背的极上部, 两肩, 两翅的小覆羽及上胸等, 都是深绯红色; 下体余部亦绯红, 而杂以黑缘的白色点斑, 在腹、两胁以及尾下覆羽等, 这些点斑变得更大, 并略带灰色; 背的余部、腰、翅上内侧覆羽及较短的尾上覆羽等均黑褐色, 杂以棕黄色虫蠹状横斑, 各羽的端部转纯琥珀褐色, 羽端具一黑缘的白色点斑; 其余的翅上覆羽也一样, 各羽端部两侧杂以绯红色; 小翼羽棕红而具黑斑; 尾上覆羽与背很相同, 但羽色较浅淡; 较长尾上覆羽的琥珀褐部分很显著, 并具狭形黑色次端斑; 飞羽和初级覆羽黑, 而具许多不规则的棕黄色横斑; 尾亦黑色, 各羽基部杂以棕白色斑纹。

虹膜褐; 嘴黑褐; 喉的裸出部暗蓝; 喉下肉裾中部蓝, 侧部草绿色, 而具 4—5 个三角形的赤红色块斑; 头上肉角蓝色; 脚粉红色。

雌性成鸟: 上体棕色以至褐色, 而具近黑色的虫蠹斑和块斑, 许多羽毛并具淡皮黄色羽干纹; 尾棕褐, 杂以不规则的黑色和皮黄色横斑; 颈和喉淡褐或皮黄色, 缘以黑色; 下体似背, 但较浅淡, 特别是腹部; 此处的羽干纹扩成近白色的矛状斑。

虹膜褐; 嘴角褐色; 眼周裸出部近蓝; 脚灰白色。

量度:

性 别	全 长	嘴 峰 (自鼻孔前缘量起)	翅	尾	跗 蹠
♂♂(3)	640—790	16	270—285	270—285	86—87
♀♀	575	11	215—235	195	66 (据德拉科, 1951)

生态 栖于海拔约 3,000 米高度的山林中, 一般不及虹雉或血雉栖息的高度。性隐匿, 善奔驰。晨昏间常至开旷地方找吃, 嗜嫩芽、球茎、细根等。至冬季降至海拔 2,000 米左右的高度。营巢在树上。

Meleagris Satyra Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1:157 (模式产地: 锡金)。