

### 38. 蓝鹇 *Lophura swinhoii* (Gould) (图版六: 图 2)

别名: 蓝腹鹇。

**地理分布** 这是我国的特产, 分布仅限于台湾省山地。

**鉴别特征** 体形似白鹇, 但尾较短; 羽冠与背白, 上体余部及下体大都黑而闪蓝; 肩红, 翅上覆羽黑, 羽端带绿; 尾羽除中央一对为白色外, 亦黑而带蓝。

**形态** 雄性成鸟(据上海自然博物馆标本): 头与颈黑, 羽冠白, 有时杂以黑斑; 后颈及颈侧为金属暗蓝色; 上背及中央一对尾羽白; 下背、腰及较短的尾上覆羽黑, 各羽具金属鲜蓝色阔边; 肩羽赤红; 翅上覆羽及外侧次级飞羽黑, 各羽宽缘以金属绿色; 初级飞羽暗棕褐色; 次级飞羽及其覆羽均黑褐, 尾羽除中央一对为白色外, 均黑带蓝, 第 2 对的内翈有时也为白色; 下体黑褐, 胸及两胁有金属暗蓝色辉亮。

嘴和距淡角色; 脸色深红; 额上肉冠及脸部肉垂亦深红; 脚和趾猩红色。

雌性成鸟: 头顶、短形羽冠及后颈等均红褐, 杂以黑色细斑, 并具棕黄色羽干纹; 背部相同, 各羽中部黑, 而羽干纹为“V”字形; 肩羽和翅上覆羽相似, 但黑色部分更为扩大而显著; 下背、腰及尾上覆羽黑, 而密杂以皮黄色虫蠹状细斑; 初级和次级飞羽均黑, 前者具棕色横斑, 后者大都有皮黄色横斑; 中央一对尾羽与尾上覆羽相同, 而具有杂以黄点的宽阔黑斑; 外侧 7 对尾羽暗栗, 略缀以黑色; 颊和喉淡褐; 胸与背同, 底色淡褐; 下体余部棕黄, 而具黑色不规则的横斑和虫蠹状细点。

量度:

性 别	全 长	嘴 峰	翅	尾	跗 跛
♂♂	790	37	250—260	410—500	90
♀♀	505	34	240—245	200—220	75

**生态** 栖息在海拔 900—2,100 米的山地密林中, 有时高达 3,000 米, 也偶见于海拔很低的稠密丛林间。平时寂静无声。繁殖在 4—6 月间。卵每窝 5—8 枚, 呈淡乳黄色(图版八: 图 13)。北京动物园所产的 9 枚卵平均大小  $52.8 (50.6—54.5) \times 40.5 (39—41.5)$  毫米。

**经济意义** 与白鹇相同。当地人民常用雄鸟白色的尾羽作为帽饰。活的蓝鹇可供展览。第一对活雉早在 1866 年就被运至欧洲。