

生态 所栖的生境与其他角雉相似,但海拔较低,约在1,000—1,600米的高度。好隐匿,善奔走,非被迫至不得已时不起飞。营巢在树上。性较怯弱,不易饲养和繁殖。

据北京动物园资料,14个卵重量平均为47.4(41—52)克,大小平均为54.5(51.5—55)×40.5(38—43)毫米。卵壳呈土黄色,满布以褐色细点(图版八:图7)。孵化期,4个卵平均为28天零一小时(27天15时30分至28天11小时)。

为我国珍禽之一,可供观赏。

Cerornis Caboti Gould, 1857, Proc. Zool. Soc. London 25: 161 (模式产地:福建武夷山)。

(二) 雉族 Phasianini

这一族包括雉及其类似的狩猎禽。尾羽的换羽从最外侧一对开始,依序脱换以至中央尾羽。体形一般较鹑族为大,翅长超过200毫米,尾一般较翅为长(除虹雉以外),但虹雉头上具羽冠,翅长超过280毫米,这些都是鹑族所没有的。

雉族国内各属检索

1. 雄性头顶具肉冠 原鸡属 *Gallus* (第148页)
 雄性头顶无肉冠 2
2. 耳羽簇发达 马鸡属 *Crossoptilon* (第127页)
 无耳羽簇 3
3. 尾显呈凸尾状,在雌雄两性均较翅长甚 4
 尾呈圆尾状,在雌雄两性均较翅短 虹雉属 *Lophophorus* (第122页)
 尾稍呈凸尾状(凸度不显),雄性稍较翅长(白鹇的尾长甚),雌性尾较翅稍长,或稍短,或几等长 6
4. 无枕冠;第1枚初级飞羽较第10枚为长;颈项无披肩,尾羽不呈侧扁状 5
 具枕冠;第1枚初级飞羽较第10枚为短;颈项上的羽毛能耸起成披肩状;尾羽侧扁
..... 锦鸡属 *Chrysolophus* (第179页)
5. 腰羽呈圆形而紧密 长尾雉属 *Syrmaticus* (第172页)
 腰羽呈矛状而离散如发 雉属 *Phasianus* (第160页)
6. 头侧被羽;尾羽不呈侧扁状 勺鸡属 *Pucrasia* (第154页)
 头侧裸出;尾羽侧扁 鹷属 *Lophura* (第138页)

XII. 虹雉属 *Lophophorus* Temminck, 1813

形态 本属的雄鸟,以羽毛闪着金属辉亮为著,故名虹雉。体形肥大,犹如雪鸡。嘴虽长而稍曲,上嘴较下嘴略大而覆盖着下嘴;脸或多或少地裸出。雄鸟头上或具羽冠,或无羽冠,但头羽都卷曲着。两翅短圆,第1枚飞羽最短,较第10枚短甚,第2枚约与第8枚等长;第5和第6枚几乎等长,且是最长的。尾较翅短,宽阔扁平,而末端几乎呈方形(♂)或稍圆形(♀),并具18枚尾羽。跗蹠粗强,较中趾连爪为短,它的极上部被羽,雄鸟并具