

25. 黑头角雉 *Tragopan melanocephalus* (J. E. Gray) (图版一: 中图 1)

地理分布 我国西藏西南隅狮泉河流域的山地;在国外,见于克什米尔。

鉴别特征 形似家鸡而稍大。头黑,颈红,通体大都黑色、而具杂斑,并满布以白色眼状斑。

形态 雄性成鸟: 头黑,最长冠羽具暗红色羽端;上颈和颈侧辉红色;上体黑,而密杂以棕灰色,各羽端处具有一个缘以黑色的白色眼状斑;肩羽处有一暗红色块斑;翅上覆羽似背,但较浅淡,并具较大的沾橄榄色眼状斑;三级飞羽亦然,并杂以心脏形的白色块斑;最长的尾上覆羽的端处白色,围以棕色并缘以黑色;尾呈棕色和黑色斑杂状,并具不规则的黑色横斑及黑色端斑;上胸被以毛状橙红色细羽;下体全部黑,而具明显的白色眼状斑,红色羽基到处显露出;腹、两胁、覆腿羽及尾下覆羽呈赭和褐色斑杂状。

虹膜褐色;嘴黑,先端呈角色;脸裸出部辉红,而在眼下有几行的蓝色细点;喉深蓝;颊的下部蓝绿;喉下肉裾辉粉红色,中贯以紫蓝色纵纹,左右分出蓝色三角形块斑,裾的边缘亦缀以蓝色;头上肉角蓝;脚依季节而呈粉红以至肉灰色。

雌性成鸟: 上体淡褐灰,满杂以粗细不同的黑斑,大多羽毛具有不规则的黑色眼状斑及白色轴纹;头和颈沾棕;尾羽亦呈黑色和灰色斑杂状,并除了中央一对以外,均具宽阔的黑色次端斑;下体呈灰色杂以暗褐色,喉羽具有暗黄色轴纹,胸羽和腹羽均具有缘以黑色的白点斑。

量度(据德拉科, 1951):

性 别	全 长	嘴 峰	翅	尾	跗 蹠
♂♂	684—735	17—20	255—290	220—250	79—97
♀♀	600	15	225—250	190—200	65

栖于海拔约 3,000—4,000 米高度的松林和混交林中,直抵森林上缘的杜鹃灌丛或桦藪间,单独或成小群活动。

Phasianus Melanocephalus J. E. Gray, 1829, in Griffith, Anim. Kingd. 8(Aves 3): 20 (模式产地: 印度阿尔摩拉)。