

3. 冠海雀 *Synthliboramphus wumizusume* (Temminck, 1835) (图 261, 图 262)

Uria wumizusume Temminck, 1835, Pl. col., livr. Pl., 579. (Shores of Japan and Korea.)

别名: 冠鹈 [辞典], 日本海乌, 冠扁嘴海雀。

英文名: Crested Murrelet, Japanese Murrelet, Japanese Auk.

地理分布 国内分布于台湾(台北八斗子、彭佳屿)及台湾附近海域(迷鸟或冬候鸟); 国外繁殖于日本东部和南部的沿海和岛屿以及朝鲜半岛南部, 在远离繁殖地的海域越冬。

鉴别特征 小型海鸟。嘴小侧扁; 夏羽除眼圈及头顶后部和枕为白色外, 整个头部包括颊、喉和冠羽以及后颈黑色; 上体暗灰色; 下体白色; 两肋黑褐色。冬羽似夏羽, 但冠羽变短, 枕部及后颈的中央暗灰色。

形态 (依据北京自然博物馆采自日本伊豆七岛鸟岛的标本描述)

成鸟夏羽: 前额黑色, 具有黑色的长形羽冠, 伸向头顶后方, 羽冠通常由 6—7 cm 长的窄羽构成; 头顶和枕部均为白色, 在头侧达到眼的上缘; 头顶中央具黑色羽毛。眼




图 261 冠海雀 *Synthliboramphus wumizusume* (Temminck) 1 和角嘴海雀 *Cerorhinca monocerata* (Pallas) 2 的分布
Fig. 261 Distribution of Crested Murrelet 1 and Horn-billed Puffin 2



图 262 冠海雀 *Synthliboramphus wumizusume* (Temminck)

脸白色; 嘴基、颊、喉、眼先经眼、颊、头侧、颈侧一直至后颈均为黑色; 背、肩和翅上覆羽暗灰色, 后颈基部及两侧深黑褐色, 其上散布长形白色丝状羽, 它们的分布上达颈侧; 飞羽、尾羽黑褐色; 胸、腹和尾下覆羽白色; 两肋黑褐色。

成鸟冬羽: 羽冠缺如或较短; 头顶黑色, 两侧各具一条宽的白色带斑; 枕部中央与后颈中央暗灰色; 余羽与夏羽相似。

幼鸟: 与成鸟冬羽相似。

虹膜褐色, 嘴和脚铅灰色。

量衡度 (mm, g; 据北京自然博物馆标本)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂ (1)	—	245	17	126	32	25
♀ (2)	—	235, 230	17, 16	121, 126	30, 32	25, 25

亚种分化 无亚种分化。

生物学 海洋性鸟类。繁殖期主要栖息于海岸和沿海岛屿。非繁殖期栖息于沿海近海海面上, 常成小群活动。叫声似尖厉的哨音。以小鱼和海洋无脊椎动物为食。

冠海雀在我国是非常偶见的冬季迷鸟或者是冬候鸟。曾于 1973 年 1 月在台北八斗子附近海岸发现过 6 只活鸟和 1 只死鸟。1982 年 5 月在台北彭佳屿发现 1 只死鸟 (颜重威, 1987; 王嘉雄等, 1991)。