

18. 小凤头燕鸥 *Thalasseus bengalensis* (Lesson, 1831) (图 226)

Sterna bengalensis Lesson, 1831, Traite d' Orn., 8: 621 (coast of India).

别名：孟加拉国燕鸥。

英文名：Little Crested Tern, Lesser Crested Tern, Bengal Tern.

地理分布 国内分布于广东（旅鸟？或迷鸟）；国外分布于地中海南部锡尔特湾，红海，波斯湾，阿拉伯海沿岸，马尔代夫群岛，印度尼西亚，帝汶海和澳大利亚东海岸（留鸟）；大洋洲，亚洲南部，非洲东部的广阔热带海洋和沿海，马达加斯加岛以及非洲西北部和北部沿海地区。

鉴别特征 中型燕鸥。头顶黑色，有同色枕冠，上体翕羽、翅均淡灰色至淡蓝灰色。




图 226 小凤头燕鸥 *Thalasseus bengalensis* (Lesson)

色，初级飞羽黑褐色；尾呈深叉状；头的余部与下体均呈白色；嘴橙黄色，脚黑色。冬羽额和头顶前部变白，仅枕和冠羽黑色，其余似夏羽。

形态 (综合文献资料)

成鸟夏羽：与大凤头燕鸥相似，惟上体色较浅，个体稍小。额、头顶、枕和冠羽黑色，后颈白色；背、腰、尾上覆羽和尾羽灰色，尾呈深叉状；眼先、眼睑以下的头侧白色；肩、翅上覆羽灰色与背同色，初级飞羽黑色，羽轴白色；下体白色。

成鸟冬羽：与夏羽相似，惟前额与头顶前部转为白色，头顶后部黑羽中有白色纵纹。

幼鸟：与成鸟冬羽相似，惟黑色枕冠较小，上体稍暗褐色，各羽具白色羽缘，翅内侧具二道暗色横带，一道在翅前缘，另一道横跨次级飞羽，尾羽近端部暗褐色。

虹膜褐色，嘴橙黄色或橙色，脚和趾黑色，蹼黄色。

量衡度 (mm, g; 据 Ali, et al., 1968)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂ ♂	—	—	59—64	280—304	121—140	25—28
♀ ♀	—	—	52—60	280—304	110—138	23—25
♂ ♂	—	380—420	—	—	—	—

亚种分化 小凤头燕鸥有3个亚种 (del Hoyo et al., 1996)。*T. b. emigrata* 亚种分布在非洲利比亚，大多数在冬季见于非洲西海岸外。*T. b. bengalensis* 亚种分布于红海、巴基斯坦、拉克沙群岛和马尔代夫群岛，冬季南至非洲南部沿海和斯里兰卡。*T. b. torresi* 亚种分布于波斯湾以及自苏拉威西至新几内亚的群岛和北澳大利亚，冬季扩展至印度北部和太平洋西南部。以往记录 (Harrison, 1983; Peters, 1934; Howard and Moore, 1976) 分布于地中海南岸直至非洲东部及马达加斯加的 *T. b. par* 亚种在此被删除了。在我国极其罕见的是指名亚种 *T. b. bengalensis*。

(1) 指名亚种 *Thalasseus bengalensis bengalensis* (Lesson, 1831)

Sterna bengalensis Lesson, 1831, Traite d'Orn., 8: 621 (coasts of India).

国内是极其罕见的旅鸟或迷鸟，仅文献有过历史记录，在广东于9月份见过2次，年代不详 (Gee et al., 1948)；国外分布自波斯湾至印度，斯里兰卡，缅甸，新加坡和印度尼西亚苏拉威西岛。

形态详见种的描述，惟上体呈淡灰色而非淡蓝色。

量衡度见种的记录。

生物学 是热带和亚热带的海洋性鸟类。主要栖息于开阔的海洋，在海岸岩石、悬崖、珊瑚礁和海滨地区以及岛屿等处活动。常结群，较多与大凤头燕鸥结伴。非繁殖期较多在远洋活动。在海面上旋飞、徘徊或跃入水中潜泳，或在海浪中索食，也在水面上点水捕食。叫声粗而尖利，似“kirrik”。

主要取食鱼类与小虾，包括鲱鱼和对虾。常与一些大型的燕鸥群一起觅食，觅食时较喧闹，很少休息。常遭军舰鸟及其他抢劫性海鸟，包括银鸥的搔扰和攻击，迫使它们吐出或放弃鱼获物，如此造成的食物损失有时会高达23%。

繁殖期5—6月，7—8月或更迟不等，由所在地区决定。在远洋岛屿的沙洲或珊瑚岛上结群繁殖，繁殖群体可达到2万对以上。常频繁地改变繁殖地点，也常与粉红燕鸥或大凤头燕鸥一起混群繁殖。通常在开阔海边、珊瑚岛的沙石、贝壳堆中挖一浅坑或找一凹穴，有时在沙堤或植被中的裸地上寻穴为巢。每窝产卵仅1枚，很少有2枚的，巢间距较小，密度为2.76巢/m²，高密度时巢与巢紧接，达到9—10巢/m²。卵为白色或淡粉红色，被有红褐色或紫灰色斑点。卵的大小为48—63 mm × 33—38 mm。孵化期21—26天，偶有30天，雏鸟着淡色绒羽，上体有黑点形成的细条纹，下体白色。2—4日龄时由亲鸟带离巢，各日龄雏集中在一起由成鸟保护，30—35日龄能飞翔，亲鸟照顾至5月龄。

小凤头燕鸥在我国极其罕见，历史记录在广东于9月份见到过2次 (Gee, et al., 1948)。Sibley等 (Sibley, et al., 1999) 1997年7月21日在广东南澳鸟屿岛见到超过30只。国内没有发现藏有标本。