

1. 斑海雀 *Brachyramphus marmoratus* Gmelin, 1789 (图 257, 图 258)

Colymbus marmoratus Gmelin, 1789, Syst. Nat., ed. 13, 1: 583 (Alaska, North America).

别名: 斑鹑 [辞典]。

英文名: Partridge Auk, Marbled Murrelet.

地理分布 国内分布见于辽宁(本溪桓仁、旅顺)、吉林(松花湖)、黑龙江(扎龙、松嫩平原、齐齐哈尔、兴凯湖)、山东(青岛)(旅鸟);福建(福州)(漂鸟);国外繁殖于俄罗斯远东沿海自堪察加半岛沿鄂霍次克海岸向南,包括萨哈林岛、千岛群岛与日本北海道,向东经过阿留申群岛至北美洲西海岸,自阿拉斯加至洛杉矶北部,在上述地区之间的太平洋海域至日本海,渤海,黄海,东海,包括琉球群岛等海区越冬。

鉴别特征 中小型海鸟。嘴细短;夏羽上体暗褐色,肩和腰缀有棕色或黄褐色横斑,下体白色而密杂以暗灰褐色横斑。冬羽上体黑灰色,头顶黑色,肩羽缀有白色,下体白色。尾黑色,非常短。





图 258 斑海雀 *Brachyramphus marmoratus* Gmelin

形态 (依据北京自然博物馆采自福建长乐标本描述)

成鸟夏羽: 头黑色, 各羽具狭窄的白色羽缘, 上体黑色, 颈、背、肩、腰和尾上覆羽具赭褐色或淡黄褐色羽尖, 在上体形成黄褐色或赭褐色横斑; 肩羽缀有纵向白色条纹; 尾羽黑色, 外侧一对尾羽具白色大理石样斑纹。头侧眼以下黑灰色, 具有淡白色斑点; 眼周围有不显著白圈; 飞羽黑褐色; 翅上覆羽黑褐色而具淡灰色羽缘。下体白色而具暗灰褐色羽缘, 喉至上胸偏奶黄色, 翼下覆羽灰褐色。

成鸟冬羽: 头顶较暗而几呈黑色; 眼周有一白圈; 颈具明显的白色领圈或羽簇; 上体余部暗灰色, 冬羽基部较淡; 肩羽缀有白色; 颈、喉、眼以下头侧、颈及下体白色; 翅下覆羽灰色。

幼鸟: 与成鸟冬羽相似, 但背具窄狭的白色羽缘; 下喉和胸具褐灰色羽缘。

虹膜暗蓝黑色, 嘴黑色, 脚的背面暗灰色闪现金属蓝色, 腹面和蹼黑色, 爪黑色。

量衡度 (mm, g; 据吴长申等, 1983; 黑龙江省野生动物研究所, 1992; 以及北京自然博物馆标本)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂ (1)	—	285	20	143	41	23
♀ (1)	225	295	18	143	42	18
♀ (1)	—	221	21	137	35	20

亚种分化 斑海雀有 2 个亚种。*B. m. perdix* 繁殖于白令海西部堪察加半岛和鄂霍次克海, 向南至萨哈林岛、千岛群岛和日本北海道, 在日本海越冬。在我国东北是冬候鸟, 在东部沿海游荡和漂泊。本亚种也被单列为一个种 *B. perdix* (Clements, 2000)。*B. m. marmoratus* 繁殖于西阿留申群岛与白令海的一些岛屿和阿拉斯加东南部, 沿北美西海岸直至加利福尼亚海岸越冬, 在我国分布的是东北亚种 *B. m. perdix*。

(1) 东北亚种 *Brachyramphus marmoratus perdix* (Pallas, 1811)

Cephus Perdix (sic!) Pallas, 1811, Zoogr. Rosso-Asiat., 2: 351, pl. 80 (Bering Is. and Okhotsk Sea, Siberia).

国内分布见种的记述; 国外分布见亚种分化记述。

形态和量衡度详见种的描述。

生物学 斑海雀在国内极其罕见, 为冬候鸟和游荡鸟。栖息于海洋和沿海及海岸附近, 性漂泊, 也会进入内陆淡水水域, 如大型湖泊, 鱼场等。繁殖期主要栖息于海岸、岛屿等处。飞翔时能直接从海面上起飞。叫声短促, 似“meer-meer-meer”。游泳时嘴和尾上翘。食物主要为鱼类和无脊椎动物。