

2. 海鸥 *Larus canus* Linnaeus, 1758 (图 198, 图 199)

Larus canus Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1: 136 (Sweden).

别名: 鸥、普通海鸥、东方海鸥、东方普通鸥。

英文名: Common Gull, Mew Gull, Eastern Common Gull.

地理分布 迁飞时旅经东北地区, 在华北、华中、华东、华南以至西南等国内广大地区越冬; 国外分布于欧洲, 地中海沿岸, 黑海, 里海, 波斯湾和北非, 北美西部, 包括阿拉斯加和东太平洋沿岸直至北回归线附近。

鉴别特征 体型似银鸥。嘴黄色, 成鸟繁殖期嘴端无色斑。头、颈和下体纯白色; 背、肩和翅灰色。冬羽头至后颈有淡褐色斑点。飞行时双翅的前后边缘呈白色。初级飞羽末端黑色, 更具白色先端斑。腰、尾上覆羽和尾羽均纯白色。脚黄色。

形态 (依据上海自然博物馆采自上海的普通亚种标本描述)

成鸟夏羽: 头、颈白色, 背、肩石板灰色; 翅上覆羽亦为石板灰色, 与背同色; 腰、尾上覆羽和尾羽均为纯白色。第 1、2 枚初级飞羽黑色而具较大的白色次端斑, 基部灰白色或在内羽形成较大形的灰色斑; 其余初级飞羽灰色, 由外向内各羽具由宽变窄的黑色次端斑及由小变大的白色端斑; 内侧初级飞羽的黑色次端斑消失, 仅存白色端斑; 次级飞羽和三级飞羽为石板灰色而具宽阔的白色端斑。下体纯白色。

成鸟冬羽: 与夏羽相似, 唯头顶、头侧、枕和后颈具淡褐色点斑, 点斑在枕部有时




图 198 海鸥 *Larus canus* Linnaeus 的分布
Fig. 198 Distribution of Common Gull
1. *L. c. kamtschatschensis* ①; 2. *L. c. heinei* ②.

排列呈纵行条纹, 在后颈排列呈横纹。

幼鸟: 上体大致呈白色, 具淡褐色横纹状斑点; 尾上覆羽白而具褐色横斑, 尾灰褐色, 基部白色; 初级飞羽黑褐色, 其他飞羽褐色而具淡白色边缘。亚成鸟尾羽白而具宽阔的黑色次端斑, 次级和三级飞羽淡灰色而具褐色块斑。

虹膜黄色; 嘴、脚和趾浅绿黄色; 幼鸟虹膜褐色, 嘴粉红色或淡褐色, 与成鸟冬季相似, 均具黑色次端斑; 脚呈肉色。

量衡度 (mm, g; 据诸葛阳等, 1990; 以及上海自然博物馆和复旦大学的标本)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (3)	—	505	42	381	151	50
	—	435	35, 35	367, 292	153, 112	56, 42
♀♀ (4)	442	481, 521	36.5	352	143	53.5
		(33—42)	(301—390)	(122—162)	(43—57)	
♀♀ (2)	—	—	36, 38	362, 399	144, 147	55, 53

亚种分化 海鸥共有 4 个亚种的分化。*L. c. canus* 繁殖于冰岛, 不列颠群岛至白海, 越冬于欧洲至北非和波斯湾。*L. c. brachyrhynchus* 繁殖于北美洲西北部, 包括阿拉斯加, 越冬于阿拉斯加南部至加利福尼亚。*L. c. kamtschatschensis* 繁殖于西伯利亚东部, 越冬于日本、朝鲜半岛和中国。*L. c. heinei* 繁殖于俄罗斯自卡宁半岛和莫斯科地区向东至西伯利亚中北部勒拿河, 越冬于东南欧和黑海、里海、波斯湾及中国东部沿海。在我国分布的主要为普通亚种 *L. c. kamtschatschensis* 和东部亚种 *L. c. heinei*。




图 199 海鸥 *Larus canus* Linnaeus

亚种检索表

- 体形稍大; 背部石板灰色稍淡; 中间数枚初级飞羽上灰色与黑色之间有楔形白斑; 虹膜色淡 普通亚种 *L. c. kamtschatschensis*
- 体形稍小; 背部石板灰色稍暗; 中间数枚初级飞羽上灰色与黑色之间无楔形白斑; 虹膜色暗 东部亚种 *L. c. heinei*

(1) 普通亚种 *Larus canus kamtschatschensis* (Bonaparte, 1857)

Gavina hinc Larus kamtschatschensis (sic!) Bonaparte, 1857, Consp. Av., 2: 224 (Kamchatka, Siberia).

Larus niveus Pallas, 1811, Zoogr. Rosso-Asiat, 2: 30; *Nec. L. niveus* Boddaert, 1783 = *L. eburneus* Phipps.

国内分布于内蒙古 (伊克昭盟)、吉林 (延边、吉林地区)、山东 (青岛、威海) (夏候鸟)。内蒙古 (呼伦池)、吉林 (长白山、珲春)、黑龙江 (大兴安岭、松嫩平原、兴凯湖、齐齐哈尔、哈尔滨)、(旅鸟)。北京 (良乡)、河北 (北戴河)、山西、辽宁 (丹东、营口、双台子河口)、上海 (崇明)、江苏 (射阳)、浙江 (杭州)、安徽、福建 (长乐、连江)、江西 (南昌、进贤、丰城、鄱阳湖)、山东 (黄河三角洲、长山列岛、庙岛群岛)、河南 (三门峡)、湖北、湖南 (洞庭湖)、广东、广西 (北部湾)、海南 (东寨港)、四川 (雅安、乐山)、贵州、云南 (昭通、昆明)、台湾 (台中)、香港 (旅鸟、冬候鸟)。国外分布见亚种分布记述。

形态及量衡度见种的描述。

(2) 东部亚种 *Larus canus heinei* Homeyer, 1853

Larus Heinei (sic!) Homeyer, 1853, Naumannia, 129 (Greece).

Larus cans L. Var. *major* Middendorff, 1853, Reise Nord. Ost. Sibir., 2 (2): 243; *nec Laroides major* C. L. Brehm, 1831 = *Larus argentatus* Linnaeus

Larus canus stegmanni Brodkorb, 1936, Orn. Monatsb., 44 (4): 122; *nom. Nov. for major*.

见于东部沿海诸省, 北京、天津 (塘沽)、河北 (秦皇岛、北戴河)、香港 (旅鸟、冬候鸟)。国外分布见亚种分化记述。

本亚种在我国的存在似有疑问 (郑作新, 1976, 1987)。按最近资料 (del Hoyo *et al.*, 1996) 本亚种繁殖于俄罗斯勒那河以西, 越冬在欧洲和黑海、里海, 在中国东部出现的可能性较小。而 *L. c. kamtschatschensis* 则在亚洲东部中国等地越冬。Gee *et al.* (1926—1927) 的记述完全符合上述普通亚种的情况。而 La Touche (1925—1934) 关于本亚种分布的记述也符合上述普通亚种的情况。La Touche 还论及东部的亚种个体比西部的大, 这也符合普通亚种体形较东部亚种稍大的情况。故 Gee 和 La Touche 记述的本亚种有疑为普通亚种的可能。由于普通亚种与东部亚种在形态上非常相似, 在野外观察时很难区分, 东部亚种在亚洲的越冬地也不太清楚, 即使存在, 也会与普通亚种重叠, 所以至今东部亚种在我国沿海分布的情况是不够明确的。香港有一个确切的记录和多个可疑记录 (Carey *et al.*, 2001)。上海复旦大学的标本经确认是普通亚种而非东部亚种。

量衡度 (mm, g; 据 La Touche, 1931—1934; Dement'ev *et al.*, 1951—1954)

性别	嘴峰	翅	跗蹠
♂♂	—	362—410	—
♀♀	—	348—395	—
♀♀ (2)	51, 53	368, 395	44, 48

生物学 繁殖期栖息在北极苔原、森林苔原、荒漠、草地等开阔地带的河流、湖泊、水塘和沼泽中。成对或成小群活动。旅经我国时见于海岸、河口、湖泊和港湾, 多集群活动, 或在空中飞翔, 低空掠过水面, 或在水面游荡。以鱼和虾、其他甲壳类、软体动物、昆虫等水生无脊椎动物为食。鸣叫声如 “kakaka...”, “kleee-a” 和 “kleee-uu-klee-uu-klee-uu”。

繁殖期在 5—7 月, 常成对或成小群营巢。筑巢于淡水或咸水湖泊、沼泽和河岸以及海边小岛等的地面、芦苇堆及土丘山坡。巢主要由枯草构成, 有时也有芦苇。每窝产卵 2—5 枚。卵为绿色或橄榄褐色, 大小为 56—63 mm × 42—45 mm。雌雄轮流孵卵, 孵化期 22—30 天。

海鸥在我国的数量, 按中国鸟类学会水鸟组 (1994) 组织的 1990—1993 年冬季全国水鸟调查, 在 1991 年时记录到最多为 12 处湿地 3 280 只; 1992 年是 11 块湿地总共 3 041 只。