

7. 乌鸮 *Bubo coromandus* (Latham)

英文名 Dusky Horned Owl.

地理分布 国内仅见于浙江建德及江西南昌。国外见于印度、孟加拉国、缅甸、泰国西南部及马来半岛。

鉴别特征 大型鸮类，外形似鸮，但体形较鸮及林鸮稍细小，虹膜黄色（鸮金，林鸮褐色）。栖息时头顶上耳簇羽竖起，几互相靠近，通体大致灰褐色，有灰白色精细虫蠹斑及斑点和黑色羽干纹，肩部有少量浅黄白色斑，翅及尾羽褐色，有浅色横斑及先端，下体较浅淡。

形态（据指名亚种 *Bubo c. coromandus* 标本）

成鸟 通体大都灰褐色，各羽均有暗褐色羽干纹及虫蠹纹，头顶较背部浅淡；耳簇羽同样暗褐，但基部较浅，内翎有灰色虫蠹纹；肩羽较背部更褐色，褐色羽干纹更明显，它的外侧有浅黄白色斑点，形成一道不明显的肩斑；覆羽似背，中覆羽及大覆羽有黄白色圆点，初级覆羽灰褐有暗褐色阔横斑；飞羽灰褐色，初级飞羽沾暗黄色，都有暗褐色阔横斑和精细虫蠹纹及斑点，最内侧次级飞羽与背同色；下背，腰及尾上覆羽灰褐色，有许多窄小暗黄色横斑和虫蠹纹；尾羽暗褐，具黄白色羽端斑，除中央尾羽外，各羽均有四道明显的深皮黄色横斑，中央尾羽的横斑不甚明显，眼先及眼的前方白色，有黑色须状干羽；面的两侧灰褐色，眼后方色较浅并有狭小黑色中间纹，耳羽后缘暗，形成一道纵纹，随后是一道界线分明的黄色皱领，有轻微灰褐色虫蠹纹及暗褐色羽干纹；额白色，其余下体灰白，各羽均有暗褐色羽干纹和轻微的褐色横斑，在腹侧更为显著，在下喉横过一道暗黄色羽，亦有褐色羽干纹，前颈基部白色，很象不明显的喉斑；腿覆羽暗黄色，有十分狭小褐色横斑；脚披羽至趾，但趾羽刚毛状灰白色。

虹膜黄色或深黄色；嘴灰白色或浅紫色，尖端角黄色；爪黑色。

量衡度：

性别	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♀(1)	50(至额基)	397	210	65
♂♀	41—43(至羽毛)	380—415	205—210	65—70 (Baker, 1927)

亚种分化 乌鸮有 2 个亚种，即指名亚种 *Bubo c. coromandus* 及马来亚种 *Bubo c. klossi* 见于我国的为：

(1) 指名亚种 *Bubo coromandus coromandus* (Latham)

见于我国浙江建德及江西南昌。国外见于印度及孟加拉国。

形态见前文。

Strix coromanda Latham, 1790, Index Orn., 1: 53 (模式产地：印度科罗曼德海岸)。

生态 乌鸮在国内非常罕见，有关它的各种生活习性，至今未见报道。据 Baker (1927)，在印度此鸮除中午时间外，白天几乎和黄昏时候一样，都在自由活动和猎食，它常在水源比较丰富的森林地区和荒漠地区活动，以猎捕鸮类、蛙、蛇、蜥蜴为食，也偶食和盗食其它鸟类的蛋，甚至猎食箭猪。在印度，它繁殖期是 11 月至 2 月，少数在 3 及 4 月产卵，占用鸮类旧巢，也在大树的树叉上用树枝营巢，并在巢中不时加上点绿叶和枝条。每窝产卵 2 枚，大小平均为 59.3×48.2 毫米。

Strix coromanda Latham, 1790, Index Orn., 1: 53 (模式产地：印度科罗曼德海岸)。