

5. 林鵰鸮 *Bubo nipalensis* Hodgson

别名 林鹰鸮。

英文名 Forest Eagle Owl.

地理分布 国内仅见于四川雅安、宝兴、会东及云南东南部河口，为罕见的留鸟。国外见于印度、尼泊尔、锡金、不丹、斯里兰卡、缅甸、泰国、老挝、越南。

鉴别特征 外形和鵰鸮相似，但体形稍小，头顶上有显著的耳簇羽，上体深褐色，多数羽缘杂有白色或浅皮黄色；下体皮黄色，腹部中央白色，在喉及胸部有深褐色横斑，并遍布粗大点斑，脚全部披羽。

形态（据指名亚种 *B. n. nipalensis* 标本） 成鸟（春羽）眼先，颊和颏等披以淡褐色近白的须状羽，但眼先羽干为黑褐色，在颈部转为白色。耳羽发达，内翈大都棕白而杂有黑褐色斑，或为黑褐色而有棕色缀黑的横斑；外翈非纯黑褐，亦杂有棕色缀黑的横斑，上体包括内侧肩羽以及覆羽均黑褐色，头项色特浓，微具隐约可见的棕色横斑。背羽及翼上的小覆羽，均杂以棕色横斑和羽缘，向后尤为显著，尤其是腰羽和中覆羽及大覆羽等；这些棕色部分均缀以黑褐色，因而斑杂成云石状。外侧肩羽棕色而具黑褐色的横斑，小翼羽和初级覆羽几纯黑褐色，初级飞羽黑褐而具淡褐色的横斑和羽端斑，次级飞羽横斑较著，且散缀以黑褐色。尾羽亦黑褐色，缀以棕色横纹和棕白色羽端，横纹和羽端均或多或少地散缀以云石状黑褐色斑点，外侧尾羽的内翈上棕色横斑较鲜亮几成纯色，下体白，稍沾棕色，在胸部特别显著。喉及胸均杂以暗褐色横斑，至腹和尾下覆羽则缩短为“V”形斑。覆腿羽白色，密杂以暗褐色横斑，腋羽和翼下覆羽的色调和胸部相似，但满布以暗褐色“V”形斑纹。

虹膜褐色；嘴蜡黄色；趾暗黄，爪角色沾红，渐转为黑色。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♀(1)	—	630	50	451	266	60

亚种分化 林鵰鸮共有 2 个亚种，即指名亚种 *B. n. nipalensis* 和斯里兰卡亚种 *B. n. blighi*，仅指名亚种分布于我国。

(1) 指名亚种 *Bubo nipalensis nipalensis* Hodgson

分布和形态见上文。

Bubo nipalensis Hodgson, 1836, As. Res., 19:172 (模式产地：尼泊尔)。

Bubo n. nipalensis, 郑作新、潘清华等, 1957, 37—38.

生态 林鵰鸮是典型林栖鸟类，在四川，栖息在 2 200 至 3 000 米左右的常绿阔叶林内；在云南河口，则栖息在 580 米的热带雨林中。白天躲藏在茂密的树枝叶丛内，黄昏时才出来活动和猎食，由于数量稀少，繁殖情况国内尚缺报道，据郑作新等（1957）报道，1954 年 4 月 6 日捕得一只雌鸟，腹部有孵卵的痕迹。据 Baker (1927) 报道，此鸟在喜马拉雅山的繁殖期为 2—3 月。6 月 20 日他得到一个即将孵化的鸟卵，认为是第一窝雏鸟孵出后所产的第二窝卵。每窝只产一卵，产在大树的天然树洞中，或鹰类旧巢和峭壁上的裂缝内。卵白色，呈卵圆形，表面光滑，10 卵平均大小为 61.2×49.9 毫米。在林沿空旷地或河岸附近猎食，它猎取大如孔雀，原鸡那样大小的鸟，并能猎取豺、兔及幼鹿，也食蜥蜴、蛇及鱼类。

Bubo nipalensis Hodgson, 1836, As. Res., 19:172 (模式产地：尼泊尔)。