

## 2. 纵纹角鸮 *Otus brucei* (Hume)

英文名 Striated Scops Owl, Pallid Scops Owl.

**地理分布** 国内仅见于新疆西部。国外见于苏联、阿富汗、伊朗、伊拉克、叙利亚、巴勒斯坦及印度等。

**鉴别特征** 小型鸮类，上体灰褐而沾沙黄色，有精细暗黄色虫蠹纹及黑色羽干纹；下体淡黄白色，有暗黄色虫蠹纹及黑色条纹。尾及跗蹠较长。

**形态** (据 Baker 等)

**成鸟** 上体灰褐而沾沙黄色；有精细的暗黄色虫蠹斑和黑色羽干纹，在头顶特别宽阔和显著；前额及顶部两侧灰色而有暗褐色斑点；眼先及羽颈白色尖端暗褐；肩羽外翮皮黄色，具黑尖，覆羽与背部相似，外翮有粗大的皮黄色斑点；初级飞羽暗褐色，第一枚飞羽有缺刻和浅茶黄色，其余飞羽外翮有近白色横斑，羽端十分斑杂，并逐渐增加，到内侧次级飞羽才和背部羽色相似；尾羽赭灰色，有暗褐色虫蠹斑及模糊的淡色横斑和黑边，但中央尾羽的横斑不显，颞白色；其余下体淡黄白色，它的虫蠹斑和黑色条纹和背部相似，但它胸部黑色纹较阔，在两胁和腹部则趋向白色，蠹纹也少，在尾下覆羽则几消失，大部呈白色；腿羽皮黄色，有宽阔暗褐色条纹。

虹膜黄色；嘴角黄，先端较暗，下嘴浅淡；脚灰色，爪暗角色。

**量衡度：**(据 Dementiev *et al.*, 1951):

性别	全长	体重	翅
♂♂(24)	210, 211	110	158.8 (150—165)
♀♀(11)	207, 210	—	161.1 (155—168)

**生态** 这是我国十分罕见的小型鸮，1908年5月8日，Сушиловская 在新疆乌什采到一个雄鸟。以后，我们一直没有采到标本，可能是一种迷鸟或迁徙时旅鸟。它的生活习性，我国没有报道。

*Ephialtes brucei* Hume, 1873, Str. Feath. 1:8 (模式产地：印度)。