

### 3. 鸦嘴卷尾 *Dicrurus annectans* (Hodgson)

英文名: Crow-billed Drongo.

*Buchanga annectans* Hodgson, 1837 (=1836), Ind. Rev. I: 326 (模式产地: 尼泊尔).

**鉴别特征** 体型较黑卷尾稍为大些; 体羽深辉黑色; 嘴形侧扁, 在鼻孔处其宽度与厚度几相等, 嘴粗壮而钝; 最外侧一对尾羽末端甚形卷曲, 其与中央一对尾羽的距离与其跗蹠的长度几相等。

**形态** (据广东贵县5月标本)

雄性成鸟(繁殖羽): 全身羽毛深灰黑色; 嘴型粗壮, 嘴端钝类似乌鸦嘴, 在鼻孔处嘴宽度为♂♂(10): 10.8(9.5—11.5)mm, ♀♀(4): 8.5—11mm; 鼻孔几为须羽覆盖; 前额、眼先绒黑色; 眼后、颊及耳羽区暗黑色; 头顶、颈、背、肩、腰和尾上覆羽均为深黑色, 并具鳞状斑闪蓝色金属光泽; 初级飞羽及翅上覆羽深黑色, 初级飞羽外翮、次级飞羽及翅上覆羽缘表面, 缀蓝色金属光泽; 尾羽暗黑暗色, 最外侧一对尾羽其末端向外上方强烈卷曲。颊黑褐色; 喉和胸深黑色, 羽端具鳞状斑的金属闪光; 腹至尾下覆羽黑褐色, 微具光泽; 翅下覆羽及腋羽黑褐色, 亚成年鸟这部分羽端具污白色羽端斑。

雌性成鸟: 酷似雄鸟, 仅体羽光泽较差。

幼鸟(据9月采自海南标本): 上体纯黑褐色, 仅个别羽端具微弱鳞状光泽; 翅角关节缘污灰白色; 翅初级飞羽暗黑褐色; 尾羽暗褐黑色, 仅基部羽缘微沾光泽, 最外侧一对尾羽末端仅稍微向上卷曲。下体颊、喉暗黑褐色; 胸深黑色, 其鳞状斑光泽稀疏而不甚显著; 腹至尾下覆羽黑褐色, 羽端具污灰白色鳞斑或尖点斑; 翅下覆羽及腋羽黑褐色, 具污白色尖端。

虹膜暗红褐色; 嘴、跗蹠、趾及爪均黑色。

**量衡度:**

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(10)	57—64	251—287	29.6 (28—31.5)	141.7 (131.5—147)	138.1 (132—150)	21.2 (20—23)
♀♀(4)	44.46 52,—	238, 245 249,—	28—31.5	131—147	119—136	20—22

**生态** 鸦嘴卷尾是热带、亚热带阔叶林与常绿林中活动、栖息的林栖鸟类。在海南岛经常出没于山区、茂密的林中或林间草地、林下灌丛间觅食, 常见经久停留于高大乔木树冠枝干上, 偶而突然起飞, 袭击过往空中飞虫, 或翱翔于林间草地, 捕食受惊起飞的昆虫; 胃检内容物几全为昆虫碎片。通常单只活动, 行动畏惧而隐蔽, 为罕见鸟类。繁殖季节为4—6月间, 巢置于乔木树高处; 每窝产3—4枚卵, 卵径平均26.3mm×19.4mm




图34 鸦嘴卷尾 *Dicrurus annectans*




图35 鸦嘴卷尾 *Dicrurus annectans* 的分布图

(Baker, 1924; Walters, 1980).

**地理分布** 国内分布于云南西部、南部西双版纳及东南部, 广西三防(九万大山)、贵县(夏候鸟); 海南岛(夏候鸟、旅鸟、留鸟)。国外分布于尼泊尔, 锡金, 不丹, 印度, 孟加拉国, 缅甸, 泰国北部(夏候鸟、留鸟); 冬季迁到马来半岛、苏门答腊岛、爪哇岛西部和加里曼丹岛北部越冬。