

2. 铜翅水雉 *Metopidius indicus* (Latham, 1790) (图 58, 图 59)

Parra indica Latham, 1790, Ind. Orn., 2: 765 (India).

Metopidius indicus Ali and Ripley, 1969, 2: 201; Baker, 1929, 6: 40—41; Zheng, 1976, 184; Johnsgard, 1981, 37—38; Hayman et al., 1986, 218—219; Cheng, 1987, 197; Peng et al., 1987, 83—84; Roberts, 1991, 284—285; Howard & Moore, 1991, 66; Yang et al., 1995, 348—349; Zhao, 1995, 458—459; del Hoyo et al., 1996, 290—291.

别名：铜绿水雉；白眉水雉。


英文名：Bronze-winged Jacana.

地理分布 国内分布于云南南部的景洪(橄榄坝/西双版纳)，偶见于广西沿海红树林(周放等, 2002) (图 58)。

国外分布于巴基斯坦，印度，孟加拉国，缅甸，泰国，柬埔寨，越南，马来半岛，印度尼西亚(苏门答腊、爪哇岛)等。

鉴别特征 额头具红色肉质额甲，眉纹白色。头、颈和下体黑色而带绿色金属光泽。背和翼上覆羽褐色闪铜辉，腰和尾羽栗色。趾及爪特长，后爪长而直。

形态 (据武汉大学、复旦大学和中国科学院动物研究所采自云南标本) 图 59 铜翅水雉 *Metopidius indicus* (Latham)



成鸟：头和颈黑色，至上背逐渐成为暗紫色，泛金属光泽。眉纹白色，一直延伸至枕后。背和两翅覆羽暗铜褐色而具金属光泽；下背、腰、尾上覆羽暗栗色。飞羽黑褐色；尾羽和尾下覆羽栗色。下体黑色，具有绿色金属光泽。腋羽以及翼下覆羽亦为黑色。雌雄相似，雌体略大于雄体。

虹膜褐色。嘴黄色，嘴基红色；具红色肉质额甲。脚和趾暗绿色，四趾和爪甚长(中趾连爪 87—106 mm)，后爪特长(50—57 mm)。

幼鸟：体羽较淡，头顶和枕部棕褐色，眉纹短，污白色。后颈和背部接近成鸟。下体白色。

量衡度 (mm, g; 据武汉大学、复旦大学和中国科学院昆明动物研究所采自云南的标本)：

性别	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂ (1)	268	31	154	48	65
♀ (1)	305	31	186	52	71
♂ (1)	296	39	178	51	77

亚种分化 无亚种分化。

生物学 栖息于浅水的沼泽、湖泊、水田、池塘中，善于在水面漂浮植物上行走。生性机警，遇到危险时急速隐入水草丛中。食水生昆虫、软体动物、植物的叶片和嫩芽等。繁殖时配偶关系为一雌多雄，雄鸟单独孵卵，并照料雏鸟。迄今国内可查到 3 号标本，是在 1956 年 4 月 24 日 (♂)、26 日 (♀) 和 5 月 3 日 (♀) 在云南景洪橄榄坝获得。1997 年 2 月有人在越南的一个地点 (Kien Giang) 统计到上千只水雉 (OBC Bull, 1997, 26: 65—66)。

种群数量稀少，已被列入国家Ⅱ级重点保护野生动物名录之中。