

34. 小滨鹬 *Calidris minuta* (Leisler, 1812) (图 164, 图 165)

Tringa minuta Leisler, 1812, Nacht. zu Bechstein's... Naturg. Deutschl., 74 (region of Hanau on the Main, Germany).

Erolia minuta Baker, 1929, 6: 234; Peters, 1934, 2: 282—283.

Erolia minuta minuta Baker, 1929, 6: 234—235.

Calidris minuta Dementiev et al., 1951, 3: 132—137; Ali & Ripley, 1969, 2: 301—303; Prater et al., 1977, 87—88; Johnsgard, 1981, 256—258; Flint et al., 1984, 113—114; Hayman et al., 1986 (1998), 369—370; Zhao, 1995, 522—523; del Hoyo et al., 1996, 521—522; Inskip et al., 1996, 82; Zheng, 2000, 43; Carey et al., 2001, 250; Zheng, 2002, 44.

英文名: Little Stint.




图 164 小滨鹬 *Calidris minuta* (Leisler)

地理分布 国内偶然分布于河北(北戴河, 5月)、山东(8月; 见 La Touche, 1931—1934, 2: 385; Jones, 1911, Ibis, p. 690)、广东(广州番禺)、青海(青海湖*, 1998年8月)、新疆(?)、台湾(台南; 见: 陈加盛, 2001)、香港(1986年4月26日; 见: Kennerley, 1987)(图165)。

国外分布于欧、亚大陆北部, 冬季至非洲、中东及南亚; 偶然分布至北美洲(阿拉斯加、加拿大)。邻近区域见于蒙古, 日本, 俄罗斯(新西伯利亚群岛、泰梅尔半岛至楚科奇半岛), 哈萨克斯坦(里海), 巴基斯坦, 印度, 尼泊尔, 缅甸, 孟加拉国, 斯里兰卡, 泰国等国; 冬季至巴布亚新几内亚、澳大利亚及塔斯马尼亚岛。

鉴别特征 与红颈滨鹬很相似。繁殖期头、颈、上胸橙褐色, 密布褐纹。但颈、喉白色。上体黑褐色, 各羽缘栗色; 背上有乳白色V形线条。

形态

成鸟(繁殖羽): 头顶、耳区、面部、颊、颈、上胸橙褐色, 密布黑褐色纹。眼先暗, 眉纹白或沾棕色。上背黑, 各羽有栗色缘或白色条纹, 形成黄色或乳白色V形图案。肩羽和三级飞羽黑褐色, 各羽缘淡栗色。翼上覆羽灰褐色, 具栗黄色缘。飞羽黑褐色, 初级飞羽的羽干多为白色。腰与尾上覆羽黑褐色, 两侧白色; 中央尾羽暗褐色, 外侧尾羽苍灰色。颈与喉白色; 上胸橙棕色。下体余部白色。雌雄同色。

成鸟(非繁殖羽): 上体灰褐色, 各羽轴较深。下体白色, 胸侧染灰褐色。

虹膜暗褐色。嘴黑色。腿黑或灰黑色, 趾间无蹼。

量衡度 (mm, g; 据中国科学院动物研究所标本)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♀(1)	—	150	18	93	43	20

分类讨论 常与小型滨鹬同归于 *Erolia* 属。有时还与红颈滨鹬 (*Calidris ruficollis*) 合为一种(不同亚种)。二者的区别在于繁殖季节小滨鹬的头侧不显赤褐色, 喉部和前颈总是白色, 而不为红棕色。

亚种分化 无亚种分化。

生物学 罕见旅鸟。繁殖地在北极圈附近, 迁徙时见于各地。栖息于水田、湖边、海滩。以甲壳类、贝类、昆虫为食。1986年以来多次记录于香港, 出现时间是每年的4—5月(Carey et al., 2001)。通常与其他小型滨鹬在一起。

* 见 J. Hornskov (1998) 调查报告。