

19. 泽鹬 *Tringa stagnatilis* (Bechstein, 1803) (图 137, 图 138)

Totanus stagnatilis Bechstein, 1803, Orn. Taschenb. Deutschl., 2: 292 (Germany).

Trinosa stagnatilis Baker, 1929, 6: 216—217; La Touche, 1931—1934, 2: 377—378; Peters, 1934, 266; Shaw, 1936, 400—401; Zheng, 1976, 205; 1987, 74; Meyer de Schauensee, 1984, 223—224; Flint et al., 1984, 123—124; Cheng, 1987, 219—220; Hayman et al., 1986 (1998), 324—325; Zhao, 1995, 492—493; del Hoyo et al., 1996, 3: 510; Carey et al., 2001, 228—229.

别名：泥泽鹬，小青足鹬（台湾）。

英文名：Marsh Sandpiper。

地理分布 国内分布于内蒙古（东胜、乌梁素海、伊克昭盟、达赉湖、海拉尔、莫力达瓦旗、呼伦贝尔，8月19日）、吉林（四平、通化、白山、延边，4—9月）、黑龙江（乌苏里江、扎龙、松嫩平原）、青海（格尔木）、新疆（乌伦古湖、天山、博斯腾湖，5月24日）（夏候鸟、旅鸟）；北京（延庆）、天津（汉沽、塘沽、大港）、河北（深南、石臼坨、北戴河、围场）、辽宁（兴城、锦州、凌源、盘锦、大洼、双台子河口、本溪、旅顺、鸭绿江口）、上海（奉贤、九段沙、佘山、崇明，9月20日）、江苏（盐城、射阳）、浙江（嘉兴、宁波、舟山、台州）、安徽（合肥）、福建（宁德、福州、长乐、惠安、泉州、晋江、厦门）、江西（鄱阳湖）、湖南（洞庭湖）、山东（垦利、东营、黄河口、莱州、泰山、渤海海峡）、广东（番禺、广州、深圳）、广西（桂林、梧州、北海）、海南（清澜港、琼山、文昌，10月26日）、甘肃（兰州、河西走廊）、台湾（大肚溪口、台南）、香港、澳门（旅鸟）。

国外分布于欧洲、亚洲（繁殖鸟），非洲和大洋洲（冬候鸟）。与中国相邻的区域如吉尔吉斯斯坦，哈萨克斯坦，俄罗斯，蒙古，韩国，日本，巴基斯坦，印度，老挝，印度尼西亚，澳大利亚等。

鉴别特征 泽鹬通常被认为是青脚鹬（*Tringa nebularia*）的“微缩型”个体。头、颈灰褐色，具暗色斑纹。上背暗色，下背、腰白色。双翅黑色，折合时特长的三级飞羽几乎与初级飞羽平齐。尾白色，有黑褐色横斑。下体白色。嘴较短，形直而细。腿细长，灰绿色或黄绿色；飞行时腿伸出尾后甚长。

形态

成鸟（繁殖羽）：前头、头顶和后颈密布白与黑相间的条纹；肩、上背、翼面沙灰，各羽中间有大块浓黑锚形斑。背、腰、尾上覆羽白色；尾白或污白色，有暗褐色横斑。初级飞羽黑褐色；次级飞羽暗褐色，微有白色边缘；三级飞羽特长，当翅折合时几乎与初级飞羽平齐。下体白色，下颈、胸侧、两胁具黑褐色斑纹。翼下覆羽白色，有少量暗色斑纹。腋羽白色。雌雄相似，雌性略大。

成鸟（非繁殖羽）：通体以上体灰和下体白的色调为主。头顶、上体为均匀的灰色或灰褐色，缺少暗色斑纹。头前、眼先、面颊和眉纹白色。下体概白色。

亚成鸟：相当于非繁殖期的成鸟。但上体较暗，具黄褐色的羽缘，翼上或有黑褐色暗斑。

虹膜黑褐色。嘴细长似锥形，黑色，基部灰绿色。腿细长，灰绿色或黄绿色。




图 137 泽鹬 *Tringa stagnatilis* (Bechstein) 的分布
Fig. 137 The distribution of Marsh Sandpiper

量衡度 (mm, g; 据中国科学院动物研究所和复旦大学标本)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
----	----	----	----	---	---	----

♂♂(15)	83	242	38.8	136	59	51.1
	(70—102)	(200—255)	(35—42.5)	(131—143)	(55—63)	(48—55)

♀♀(11)	86	238	40	139.5	60	50.2
	(79—93)	(216—254)	(38—43)	(132—143)	(57—64)	(47—53)

♂♂(2幼)	67, 63	220, 219	36, 31	131, 130	51, 52	46, 43
--------	--------	----------	--------	----------	--------	--------

亚种分化 无亚种分化。

生物学 泽鹬大多在西伯利亚中部繁殖。

在中国主要是旅鸟。通常栖息于溪边的草地、

开阔的沼泽、淡水区或微咸湖边。4月底—8

月繁殖，喜欢集群营巢，巢间距最近10m以

内，双亲共同孵育。大多在水中觅食，合作

群。轻快、稳定，啄食水面食物。9月即有最

先到达越冬地的。3—5月回迁。通常非繁殖

个体滞留不返或四处游荡。现存中国科学院

动物研究所的70余号泽鹬标本，绝大部分采

自天津塘沽，时间为4—5月和9月。显然都

是过路鸟（旅鸟）。1993—1998年的香港抽样

调查统计表明，春季和秋季有1 670—2 350

只泽鹬途经或滞留香港，几乎占去地区种群的2%—3% (Rose and Scott, 1997; Carey et al., 2001)。而近年在江苏盐城自然保护区统计，秋季和春季最多分别记录到6 022和

9 026只，可能是地区种群的5%—10% (Wang, 1997; Barter, 2002)。




图 138 泽鹬 *Tringa stagnatilis* (Bechstein)