

3. 蓝翅叶鹎 *Chloropsis cochinchinensis* (Gmelin) (图版八: 3)

地理分布 云南西部、西南部至东南部(留鸟)。国外分布于斯里兰卡,印度,尼泊尔,锡金,不丹,孟加拉国、中南半岛,印度尼西亚。

鉴别特征 雄鸟额沾黄色,头顶黄绿染褐;上体草绿;飞羽黑色,初级飞羽外翈及小覆羽、初级覆羽亮钴蓝,其余翅表面与背略同;尾蓝绿色;眼先及喉黑色;下嘴基部有一小形紫蓝斑;胸部缀以黄色;下体浅绿。雌鸟眼先至颈、喉为蓝绿色,近嘴基部钴蓝;除小覆羽外,余翅表面大都绿色;余与雄鸟相似。



分布图 78 蓝翅叶鹎 *Chloropsis cochinchinensis kinneari* •

形态 (*C. c. kinneari*, 采自云南)

雄性成鸟: 额至眼上方浅黄; 前头绿色, 头顶至枕部转呈绿色而沾以铜黄或铜褐色, 颈侧略同; 背、腰、尾上覆羽草绿色; 小覆羽亮钴蓝, 初级覆羽和小翼羽深蓝而外缘微具亮钴蓝色; 飞羽黑色, 外侧初级飞羽具亮钴蓝外缘, 其余翅表面大都绿色, 较上体为深; 尾羽概具暗褐色羽轴, 中央尾羽暗绿, 外侧尾羽沾钴蓝色, 除最外侧 1—2 对外, 其余尾羽基部外缘或多或少渲染以绿色; 眼先、眼下前方前部、颈以及喉部中央纯黑; 外围以淡黄色环带, 其外更渲染以污黄色; 下嘴基部具一紫蓝色短髭纹; 耳羽绿而缀以铜褐色; 下体淡绿; 翼缘蓝色; 翼下覆羽灰褐染绿。

雌性成鸟: 额绿; 小覆羽浅钴蓝; 小翼羽和初级覆羽蓝绿, 其余翅表面与上体同为草绿色, 外侧飞羽外翈尚缀浅蓝; 眼先沾绿蓝色, 眼周绿; 耳羽与头顶同色; 鬚纹不显, 呈淡钴蓝色; 颈、喉部中央淡蓝绿色, 外围微缀黄; 余下体浅草绿色。

虹膜棕色至褐色; 嘴黑色; 跗蹠淡灰或淡蓝色。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(16)	24.0 (18—33)	169.2 (158—182)	17.8 (17—19)	81.3 (78—84.5)	69.3 (66.5—73.5)	17.3 (16.5—19)
♀♀(11)	24.7 (20—35)	163.8 (150—175)	17.4 (16—18.5)	76.9 (73.5—82)	65.7 (62—68.5)	17.5 (16—18)

分类讨论 地理变异表现在自眼先沿颈侧连于黑喉斑的黄环带深浅和宽窄的不一, 以及枕部至上体和胸部渲染黄色的多少。分布在云南西双版纳的 *kinneari*, 是 11 个亚种中在分布区北部的一个亚种, 羽色最为深暗, 与分布在毗邻的缅甸全境内的 *chlorocephala* 近似, 但雄鸟和雌鸟上背部深绿而无黄色渲染, 头、颈及上胸均无金黄色渲染 (Hall et Deignan, 1956)。查与缅甸东北部接壤的云南盈江的 2♂♂ (1月), 与云南西南部和南部的 17♂♂ 略有差别。前头黄绿色鲜亮, 下体的绿色较浅淡。其中 1 只上体的绿色较后者浅淡, 呈现黄绿色, 后头、颈侧以至前胸的铜黄色差淡; 另 1 只的黑喉后方的浅黄色范围较广。因没有 *chlorocephala* 的标本以资参考, 暂将盈江标本定为 *kinneari*。

雌鸟易与橙腹叶鹎幼鸟混淆, 但髭纹短, 喉部沾蓝, 与后者髭纹长, 喉部绿色不沾蓝有别; 此外, 体形较小。

亚种分化 计 11 个亚种, 见于中国的有 1 个亚种。

(1) 云南京种 *Chloropsis cochinchinensis kinneari* Hall et Deignan

云南西部盈江、西南部、南部西双版纳及东南部河口(留鸟)。国外分布于中南半岛北部包括泰国东部平原的北部。

形态见种的描述。

Chloropsis cochinchinensis kinneari Hall et Deignan, 1956, Bull. Brit. Orn. Cl. 76:96 (模式产地: 越南北部)。

生态 栖于海拔约 1,600 米以下的开阔常绿次生林。多结集小群活动在乔木上, 初春见有单独活动。不畏人, 鸣声婉啭悦耳。

采自 1 月 (1 只)、4 月 (2 只) 和 5 月 (1 只) 的 4 只胃内有花、果实, 以及甲虫和鳞翅目幼虫等 (各 1 次)。郑作新等 (1960, 1962) 报道了 5 月、6 月获自云南东南部的 2 只胃内含物为种子及昆虫; 采自西双版纳的 13 只鸟胃, 除 1 只胃内有少许植物碎片外, 余物为昆虫。

1958 年在云南东南部于 4 月 18 日及 5 月 5 日采得蓝翅叶鹎巢各 1 个。巢呈深杯状, 内以柔细的草茎编织而成, 外敷以蛛丝。巢营于高约 7 米的刺桐和芒果树上, 距地 5 米左右。巢径 6—6.5 厘米, 深 6—6.5 厘米。一巢内有卵 3 枚, 另一巢内仅有 1 枚卵。卵呈乳白色, 布有不规则的灰色斑纹。

Turdus cochinchinensis Gmelin, 1788, Syst. Nat., ed. 13, I: 825 (模式产地: 越南南部)。

Chloropsis cochinchinensis, 郑作新, 1976, 456—457; Mayr et Greenway, 1960, 9: 304—305.