

36. 长趾滨鹬 *Calidris subminuta* (Middendorff, 1853) (图 167, 图 168)

Tringa subminuta Middendorff, 1853, Reise Nord. und Ost. Siber, 2: 222 (Siberia).

Erolia subminuta Baker, 1929, 6: 236—237; La Touche, 1931—1934, 2: 385; Peters, 1934, 2: 283; Shaw, 1936, 428—429.

Calidris subminuta Dementiev *et al.*, 1951, 3: 140—143; Kozlova, 1962, 2: 67—72; Ali & Ripley, 1969, 2: 305—306; Howard & Moore, 1984, 128; Johnsgard, 1981, 263—265; Zheng, 1976, 220; 1983, 106; Zoological Division, 1983, 103—104; Meyer de Schauensee, 1984, 219; Flint *et al.*, 1984, 114—115; Cheng, 1987, 236—237; Hayman *et al.*, 1986 (1998), 371—372; Zhao, 1995, 523—525; del Hoyo *et al.*, 1996, 522; Inskipp *et al.*, 1996, 82; Carey *et al.*, 2001, 251—252.

别名: 长趾鹬, 云雀鹬。

英文名: Long-toed Stint.

地理分布 国内分布于北京(西郊, 5月8日)、天津、河北(北戴河、新安, 5月20—28日)、山西、内蒙古(呼伦贝尔盟)、辽宁(鸭绿江口、旅顺、朝阳)、吉林、黑龙江(大兴安岭、泰康、泰来、哈尔滨)、上海(江湾、崇明)、江苏、浙江(宁波、台州)、江西(鄱阳湖)、山东(黄河口)、湖北、湖南(长沙)、重庆(秀山)、四川(成都、雅安、天全、南充)、云南、西藏(八宿, 8月27日)、陕西(西乡, 9月5日)、甘肃(兰州、东居延海, 7月3日)、青海(西宁、河南、囊谦、黄河上游、格尔木、




图 167 长趾滨鹬 *Calidris subminuta* (Middendorff) 的分布
Fig. 167 The distribution of Long-toed Stint




图 168 长趾滨鹬 *Calidris subminuta* (Middendorff)

玉树)、宁夏(永宁)(旅鸟); 福建(福州谷地)、广东(揭阳)、广西(沿海)、海南(万宁, 11月)、台湾(东石、台南、兰屿)、香港(壆原)、西沙群岛(旅鸟, 少量冬候鸟)。

国外分布于俄罗斯(西伯利亚、贝加尔湖区、斯塔诺夫山脉、乌达河口), 千岛群岛, 阿拉斯加(美), 韩国, 日本, 蒙古, 哈萨克斯坦, 伊朗, 沙特阿拉伯, 阿曼, 印度, 尼泊尔, 斯里兰卡, 缅甸, 老挝, 菲律宾, 马来半岛, 印度尼西亚, 澳大利亚等地。

鉴别特征 繁殖期头顶棕色, 有黑色细纹; 眉纹白色。上体黑褐色, 羽缘棕色和黄白色。下体白色, 颈、胸部具黑褐色羽干纵纹。腿黄绿色; 后趾较长; 中趾稍长于喙峰; 中趾连爪的长度达 23 mm 左右, 略长于跗蹠。

形态 眉纹白色。前额和头顶黑褐色, 羽缘棕黄色, 形成黑色与棕黄色斑杂的纵纹。后颈灰褐色, 多暗纹。肩、上背羽黑色, 各羽缘杂红褐色或白色, 有时形成上体的“V”形白带。飞羽黑褐色, 最外侧的初级飞羽羽干白色, 其余褐色。两翼覆羽和三级飞羽黑褐色, 具较阔的浅棕或白色羽缘。三级飞羽特长, 折合时几乎与初级飞羽尖端平齐。下背、腰、尾上覆羽和中央尾羽黑褐色, 腰两侧白色, 外侧尾羽灰色。颊、喉中央白色, 颊及颈侧、胸部具淡褐色斑点或纵纹; 胸部渲染浅棕色; 下体余部皆呈白色。

虹膜暗褐色。喙黑色, 下喙基部略有黄色或褐色; 喙端部略微下垂。腿黄绿; 趾较长, 尤其是后趾; 中趾稍长于喙峰。

量衡度 (mm, g; 据中国科学院动物研究所标本)

性别	体重	全长	喙峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (12)	26.4	147	17.5	89	38	19.9
	(21—31)	(142—164)	(16.5—19)	(84—94)	(33—42)	(18—21)
♀♀ (7)	27.4	145	18.1	91	39	19.9
	(18—35)	(138—153)	(16—19)	(89—93)	(37—42)	(19—21)

分类讨论 有时将长趾滨鹬 (*C. subminuta*) 与美洲小滨鹬 (*C. minutilla*) 合为一种。但 Johnsgard (1981) 认为二者区别甚大。故仍为独立种。

亚种分化 无亚种分化。

生物学 长趾滨鹬繁殖地在西伯利亚苔原地区、泰加林区、草地和海滨。是中国的旅鸟。迁徙季节见于海边湿地、鱼塘、水田、河滨、湖边、淡水沼泽、溪流旁和小水坑中。喜欢集小群活动, 或与其他小型滨鹬混群。食甲壳类、软体动物、昆虫和植物碎片。据《海南岛的鸟兽》(1983), 剖检 1 只鸟胃, 有昆虫碎片和少量苔藓植物。1993 年 4 月 13 日在香港记录到 175 只 (Carey *et al.*, 2001)。据郑作新等 (1983) 在西藏分布于海拔 4 100m。