

16. 中亚鸽 *Columba eversmanni* Bonaparte

英文名 Eastern Stock Pigeon.

地理分布 见于新疆西部喀什和天山，北部阿尔泰山脉；偶亦获见于新疆东部罗布泊。在国外，分布于苏联土耳其斯坦 (Turkestan)，从咸海 (Aral Sea) 至阿富汗北部，东抵 Zaisan-nor；冬时南迁至印度的西北部。

鉴别特征 与欧鸽相似，但体形较小。头顶沾葡萄酒色；颈部有金属反光的羽毛呈浅铜红色；下背白；腰和尾上覆羽均石板灰色。

形态 (主要据 Baker, 1928)

成鸟 雌雄同色。头顶灰而沾葡萄酒色；眼先、颊、耳羽、颞及喉等鸽灰；后颈及肩间部灰而带绿色和带紫红色闪亮；颈侧各具一个显著辉亮的浅铜红色块斑；背和肩均灰；下背白；腰和尾上覆羽均石板灰，羽缘暗褐；尾羽大都灰色，而具宽阔的黑端，外侧尾羽还贯以浅灰色横斑；翅上覆羽大都鸽灰，中和大覆羽的基部黑，并成两道横斑；初级和次级飞羽均灰，第一枚初级飞羽内翽基部白，内侧次级飞羽与背同色；但羽基具一宽阔的黑色横斑；胸呈鸽灰色，而渲染葡萄酒色更显；腹和尾下覆羽均灰，后者较暗；腹羽和翅下覆羽悉白。

虹膜浅黄以至金褐色；嘴淡绿，基部沾灰，端部带褐；跗蹠淡肉色；爪角褐。

量衡度(据 Ali and Ripley, 1969):

性别	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♀	约 16—19	200—208	96—105	约 26—28 (Hartert)
♂♂(7)	体重	翅		
	183—234	197—205	(Paludan)	

分类讨论 本种无亚种分化。从前有人(如 Baker, 1928)把这一种作为欧鸽 (*C. oenas*) 是一亚种，但因本种与欧鸽繁殖范围有重叠现象，故应把它们为作为两个独立种。

生态 常结小群活动，越冬时群集更大，也常与其他鸽类混群。嗜食桑椹、玉米及其他作物，对农作有一定的害处。

Columba eversmanni Bonaparte, 1856, Conpt. rend. Acad. Sci. Paris, 43:838(模式产地: 亚洲西部和中部); Salvadori, 1893, 264—265; Peters, 1961, 61; Vaurie, 1965, 542; Ali and Ripley, 1969, 128—129; Goodwin, 1970, 68—69; 郑作新, 1976, 266; de Schauensee, 1984, 249.

Columba oenas eversmanni, Baker, 1928, 226—227.