

17. 斑尾林鸽 *Columba palumbus* Linnaeus

英文名 Wood Pigeon, Ring Dove or Cushat.

地理分布 仅见于新疆西部及天山。在国外, 分布于欧洲树林地区, 北抵北纬 66°, 非洲西北隅, 小亚细亚; 东抵苏联土耳其斯坦, 巴基斯坦, 尼泊尔, 印度西北部以至锡金。

鉴别特征 大型强健的灰和褐色的鸽; 后颈下部具一个乳黄色半领环状领斑; 翅上有一宽阔近白色横斑, 飞时尤显。

形态(主要依阿尔巴尼亚地拉那地区的指名亚种)

成鸟 雌雄同色。头和颈等悉暗灰, 颊和喉稍淡; 后颈下部闪着绿辉, 两侧各具一个乳白色块斑; 翳部褐灰; 最外侧的覆羽外翈纯白, 它们内侧的覆羽外缘亦白, 因而形成一道宽阔的纵纹; 初级覆羽黑褐; 初级飞羽和外侧次级飞羽均石板黑, 各羽外缘白; 下背、腰及尾上覆羽等均深灰; 尾亦灰而具宽阔的黑端; 胸和其两侧悉淡紫粉红色, 向后渐转灰色; 尾羽基部下面灰, 中部盘以灰白色横带, 端部黑。

虹膜淡黄; 眼围洋红; 嘴的基部橙红、中部粉红近白、端部橙黄; 脚和趾珊瑚红, 爪黑。

量衡度(据 Baker 对 *P. p. casiotis* 的量度):

性别	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♀	约 400—430	15.5—18	139—153	139—153	约 24—27

亚种分化 本种有 6 个亚种的分化; 我国只有其中之一, 即新疆亚种 *Columba palumbus casiotis*。这一亚种与上述的指名亚种相似, 但颈侧块斑较小, 而呈皮黄色, 不似指名亚种之为白色。

量度见前。

Palumbus casiotis Bonaparte, 1854, Compt. rend. Acad. Sci. Paris, 39: 1103 (模式产地: "Chinese Tartary" = 新疆西部)。

生态 常结群活动, 亦如其他鸽类; 冬时群集更大。觅食于地面, 或在丛树或灌木间。食物为田间遗留的谷粒、幼芽、橡实、桑椹及其他浆果等。国内无关于这种鸽的垂直迁移及繁殖等资料。

Columba palumbus Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1: 163 (模式产地: 瑞典)。

Columba palumbus Salvadori, 1893, 299—301; Baker, 1928, 227—228; Peters, 1961, 61—62; Vaurie, 1965, 537—539; Ali and Ripley, 1969, 129—131; Goodwin, 1970, 70—72; 郑作新, 1976, 266—267; de Schauensee, 1984, 249.